Revista Científica

Faece Saúde

ISSN: 2317-8248

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição

Ano 3 – nº 5 – Outubro/2015

Expediente

Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE

Diretora
Profª. Mestre Rita Maria Silveira da Silva

Coordenadora Pedagógica
Profª. Mestre Adryana Lúcia Lobo Bezerra

Conselho Editorial

- Profª. M.Sc. Fabrícia Salvador Bezerra
- Profª. M.Sc. Ivanete Gomes da Silva
- Prof. Esp. Médico José Musse Costa Lima Jereissati
- Profª. M.Sc. Kelly Sivocy Sampaio Teixeira
- Profª. M.Sc. Carla Daniele Mota Rêgo Viana
- Profª. M.Sc. Rita Maria Silveira da Silva

Diagramação e Designer

- Francisco José Carneiro da Silva

Revisão

- Profa. Mestre Ivanete Gomes da Silva

SUMÁRIO

ALIMENTOS FUNCIONAIS: EFEITOS BENÉFICOS DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS CONTENDO PROBÍOTICOS 8

ABORDAGEM DE ENFERMAGEM A PACIENTES ACOMETIDOS POR CANDIDÍASE VULVOVAGINAL 9

ESTUDO DE CASO: PACIENTE PORTADOR DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL (CIA) 10

AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ULCERAS POR PRESSÃO E AS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM IMPLEMENTADAS A PACIENTES NEUROCIRURGICOS DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA. 11

MARCADORES BIOQUÍMICOS DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 12

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE PLACENTA PRÉVIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 13

OLHOS E OUVIDOS 14

FRATURA BILATERAL DE MANDÍBULA:ESTUDO DE CASO 15

CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA ANATÔMICA SOBRE GRAVIDEZ ECTÓPICA 16

SEGURANÇA DO PACIENTE 17

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA VÍTIMA DE FRATURA: UM ESTUDO DE CASO 18

QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 19

O USO DO DNA RECOMBINANTE NA PRODUÇÃO DE INSULINA ARTIFICIAL 20

BENEFÍCIOS DA TERAPIA A VÁCUO DENTRO DO PROCESSO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DAS LESÕES EM PÉ DIABÉTICO 21

ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE HOSPITALIZADO: O PALHAÇO NO HOSPITAL COMO ESTRATÉGIA PARA HUMANIZAÇÃO 22

DEPRESSÃO EM IDOSO INSTITUCIONALIZADO: PERCEPÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE. 23

CONSTRUÇÃO DE PEÇA SOBRE PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLAMPSIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 24

ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS: ANÁLISE DE ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO 25

AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DE PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MARACANAÚ – CE 26

ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ANTINEOPLÁSICOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO A PARTIR DOS INDICADORES DE PRODUTIVIDADE. 27

QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES QUE AMAMENTAM: PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS 28

PLANTAS MEDICINAIS USADAS COMO HIPOGLICEMIANTES EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS. 29

CONFECÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PERI OPERATÓRIO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO CEARÁ..... 32

APÓS UM TRAUMA - A EPOPÉIA DE UM ATENDIMENTO: UM ESTUDO DE CASO 33

DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL..... 34

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PARA O PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA..... 35

DIAGNÓSTICO DE DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ (DHEG): PLANO DE CUIDADOS SEGUNDO A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. 36

CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA ANATÔMICA SOBRE INTERCORRÊNCIAS GESTACIONAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA..... 37

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE PLACENTA PRÉVIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA..... 38

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE A PRÉ-ECLÂMPSIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA..... 39

CARACTERÍSTICAS DAS OCORRÊNCIAS PEDIÁTRICAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO CEARA 40

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE OBESO MÓRBIDO SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM E ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS..... 41

AS BARREIRAS À PRÁTICA DE ENFERMAGEM BASEADAS EM EVIDÊNCIAS: UM ESTUDO DESCRITIVO 42

ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE FORTALEZA EM RELAÇÃO AO TRAUMA EM IDOSO 43

PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL FRENTE AO ATENDIMENTO DE URGENCIA EMOCORRÊNCIA PEDIÁTRICA 44

PARASITOSES INTESTINAIS: A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE INFESTAÇÃO POR *ASCARIS LUMBRICOIDE* 45

O PERIGO QUE AS BACTÉRIAS OFERECEM QUANDO NÃO SE CONHECE SUA EXISTÊNCIA..... 46

MÉTODO CONTRACEPTIVO DE LACTAÇÃO COM AMENORRÉIA: PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS NUTRIZES..... 47

CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES IDOSOS INTERNADOS COM PNEUMONIA ASPIRATIVA 48

IMPACTO PSICOLÓGICO DO PACIENTE COM HANSENIASE 49

HPV: O QUE PRECISAMOS SABER? 49

FONTES DE CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA – CE: UM ESTUDO DESCRITIVO À LUZ DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA. 51

ESTUDO DE CASO PACIENTE COM LITÍASE BILIAR..... 52

PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA: CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA – CE 53

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE INFORMAÇÃO PELOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA- CE: UM ESTUDO DESCRITIVO ATRAVÉS DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. 54

TRICOMONÍASE: A DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL NÃO VIRAL MAIS COMUM NO MUNDO..... 55

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PACIENTE COM FATORES DE RISCO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E MAMA: ESTUDO DE CASO BASEADO NO REFERENCIAL TEÓRICO DE HILDEGARD ELIZABETH PEPLAU 56

RELATO DE EXPERIÊNCIA E CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBREODESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA..... 57

QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS HOSPITALIZADOS PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA..... 58

PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADA A GESTANTE NA CONSULTA DE PRÉ - NATAL: UM ESTUDO DE CASO EMBASADO NO REFERENCIAL TEÓRICO DE IMOGENE KING. 59

PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO AO PACIENTE COM OBESIDADE GRAU II: ESTUDO DE CASO BASEADO NO REFERENCIAL TEÓRICO DE OREM..... 60

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE: HIGIENE PESSOAL PARA IDOSOS 61

VIGILANCIA EM ACESSO VASCULAR PARA HEMODIÁLISE..... 62

NOVOS TIPOS DE HIPOGLICEMIANTES NO MERCADO 63

MARCADORES USADOS NO DIAGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA..... 64

AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL POR OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS 65

APLICAÇÃO TERAPÊUTICA DOS ANTICORPOS MONOCLONAIS 66

ÁCIDOS GRAXOS, ÔMEGA 3 E PLAQUETAS NAS DOÊNÇAS CARDÍACAS. .. 67

UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS POR ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA..... 68

ALTERAÇÃO SOROLÓGIA APÓS USO DE FOTOPROTETOR – RELATO DE CASO. 69

INFLUÊNCIA DE USUÁRIOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE FITOTERÁPICOS SEM PRESCRIÇÃO. 70

PERFIL DOS PACIENTES INFARTADOS COM DIABETES DESCONHECIDA .. 71

IMPACTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM TRABALHADORES HIPERTENSOS EM UMA INDUSTRIA 72

ANÁLISE DE QUALIDADE DE CÁPSULAS MANIPULADAS E INDUSTRIALIZADAS DE CEFALEXINA 73

ENFEMAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS : NECESSIDADES E BUSCA DE INFORMAÇÃO 74

TERAPIA GÊNICA, RISCOS E BENEFÍCIOS..... 75

SUMUÁRIO DE URINA: EXAME QUÍMICO DA URINA..... 76

PERFIL DO USO DE MEDICAMENTOS ANOREXÍGENOS POR ALUNOS DO CURSO DE FARMÁCIA EM UMA FACULDADE DE FORTALEZA-CE..... 77

PERFIL DE VENDAS DOS MEDICAMENTOS USADOS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE EM UMA FARMÁCIA COMERCIAL EM CASCAVEL-CE..... 78

PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EMAGRECEDORAS EM UMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE FORTALEZA..... 79

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS EM RELAÇÃO AOS CUIDADOS PRESTADOS AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. 80

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA AO PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: ESTUDO DE CASO..... 81

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS INTERCORRÊNCIAS COM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM REGIME HEMODIALITICO..... 82

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO: ESTUDO DE CASO..... 83

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS..... 84

PRÁTICA DE ALEITAMENTO MATERNO VIVENCIADA POR MULHERES TRABALHADORAS: PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS..... 85

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE ABORTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 86

DEPRESSÃO E DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS: UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 87

AVALIAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 88

AVALIAÇÃO DO PERFIL DAS MULHERES ACOMETIDAS DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO..... 89

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ACOMPANHANTES EM RELAÇÃO À ÚLCERA POR PRESSÃO 90

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES HIPERTENSOS 91

INDICADORES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES PÚBLICAS E PARTICULARES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 92

ESTILO DE VIDA DE PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO QUE RETORNAM PARA A EMERGÊNCIA 93

DIFICULDADES NA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: PERCEPÇÕES DE MULHERES 94

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 95

CARACTERIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SAMU CE 96

AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO EM ACADÊMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FAECE 97

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO TRABALHO DE PARTO E PARTO 98

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE UMA DAS COMPLICACÕES DA GRAVIDEZ: RELATO DE EXPERIÊNCIA 99

ANABOLIZANTES - BENEFÍCIOS OU MALEFÍCIOS? 100

SINDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA – SARA 101

COMO CONVIVER COM A ANEMIA FALCIFORME 102

DOR CRÔNICA: SINTOMA QUE PASSOU A SER CONSIDERADA DOENÇA. 103

ALIMENTOS FUNCIONAIS: EFEITOS BENÉFICOS DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS CONTENDO PROBÍOTICOS

Ana Paula Alvares, Elizabete Costa, Georgett Kennya, George Madson,Jose WilkerMartins, Karine Queiroz, Meryhelen Martins,Mirtes Elaine,Naina Gomes,Rosimeire Fialho, Thasio Santos[1]
Alba Fabiola[2]

INTRODUÇÃO: os alimentos funcionais exercem um papel importante para a qualidade de vida do ser humano, que além das funções nutricionais básicas, apresentam efeitos benéficos para a saúde, quando consumidos como parte da dieta habitual, também são capazes de reduzir o risco de algumas doenças e auxiliar em funções fisiológicas do organismo, entre eles estão os probióticos, que são microrganismos vivos que colonizam e protegem a parede intestinal, evitando, assim que moléculas alergênicas e microrganismos patogênicos façam mal á saúde. **OBJETIVO**: Desenvolver por meio de pesquisa bibliográfica a importância do consumo de alimentos probióticos. Cujas propriedades funcionais são bastante relevantes em beneficio da saúde. **METODOLOGIA**: O trabalho foi definido a partir de pesquisa de dados em livros, sites, e artigos científicos. Todas essas informações foram revisadas e estudadas para melhor compreensão. **RESULTADOS E DISCUSSÕES**: A combinação dos avanços genéticos com informações mais completas sobre os genomas aumenta as possibilidades futuras para o desenvolvimento de cepas probióticas mais eficazes. Goldin (1998) diz que, Os probióticos são definidos como "microrganismos vivos" que, quando são consumidos, agem no trato gastrintestinal do organismo hospedeiro melhorando o balanço microbiano intestinal. Holzapfel et. al. (1998) define probióticos como culturas puras ou mistas de microrganismos vivos (bactérias láticas e outras bactérias ou leveduras aplicadas como células secas ou em um produto fermentado). **CONCLUSÕES**: os probióticos são representados pelas culturas de microrganismos vivos, bactérias e leveduras benéficas. São capazes de atuar de três formas diferentes, como na supressão do numero de células viáveis ao produzir compostos; alteração do metabolismo microbiano e estimulação da imunidade do hospedeiro, conferindo ao individuo efeitos de ordem microbiana, nutricional e fisiológica.

PALAVRAS CHAVES: probióticos, alimentos, microrganismos, vida, Metabolismos

[1] Acadêmicos do Curso de Farmácia
[2] Docente do Curso de Farmácia

ABORDAGEM DE ENFERMAGEM A PACIENTES ACOMETIDOS POR CANDIDÍASE VULVOVAGINAL

Bruna Mayra S. Maciel, José Wellingtonde S. Dias, Kamila Teixeirade Lima, Maria Nykolle G. Viana, Nilcileide Queiroz Bragado, Maria Wikaelle M. Sousa, Rênia Cyntia A. A. de Souza[3]
Rosilaine G. Santos Paixão[4]

INTRODUÇÃO: A candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e da vagina causada pelo crescimento excessivo de um tipo de fungo, denominado na maioria dos casos *Candida albicans*. A vagina em condições normais é habitada por microorganismos que constituem sua flora normal. Quando há um desequilíbrio na flora e/ ou no sistema imunológico da mulher, ocorre a multiplicação da Candida, que produz a candidíase vulvovaginal. **OBJETIVO**: No papel da enfermagem, ampliar os conhecimentos sobre candidíase vulvovaginal e atuar na educação, promoção e prevenção da doença na população. **METODOLOGIA**: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Para embasar os estudos, foram utilizados meios de pesquisas, como livros e artigos científicos disponíveis em sites e revistas eletrônicas. **RESULTADOS**: Estima-se que 75% das mulheres desenvolvem candidíase vulvovaginal episódica, e cerca de 50% sofrem dois ou mais episódios por ano. O número vem aumentando nas últimas décadas. **CONCLUSÃO**: Conclui-se que a candidíase vulvovaginal é uma infecção considerada um grave problema de saúde pública. Nota-se que a patologia é responsável por causar sintomas extremamente desagradáveis, que interferem na qualidade de vida. A atuação dos profissionais de enfermagem revela-se fundamental para a promoção, prevenção e recuperação utilizando como meio a educação em saúde.

PALAVRAS CHAVE: Candidíase Vulvovaginal; Enfermagem; Promoção; Prevenção; Educação.

[3] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[4] Docente do Curso de Enfermagem

ESTUDO DE CASO: PACIENTE PORTADOR DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL (CIA)

Silva.N.B.N.F,Sousa.F..A,Xavier.T.P
Sales.F.C.I

Introdução:A comunicação interatrial (CIA) é uma das malformações congênitas mais frequentes, representando aproximadamente 5% a 10% de todos os defeitos cardíacos congênitos.Planejar a assistência de enfermagem para pacientes que serão submetidos a cirurgia cardíaca requer da enfermagem habilidade e conhecimento a respeito dos possíveis medos e das prováveis reações emocionais que o paciente pode apresentar frente a essa situação.**Objetivo:** descrever caso clínico do paciente implementando a sistematização da assistência de enfermagem (SAE). **Metodologia:**Trata-se de um estudo de caso individual,realizado em um Hospital de médio porte localizado no município de Fortaleza, em março de 2015 para a disciplina de APS(Atividade Prática Supervisionada) do curso de Enfermagem.Os dados foram coletados durante a internação do paciente, através de uma entrevista ao paciente R.A.F.F, e exame físico. Em um segundo momento, foram colhidos dados no prontuário no qual constam informações de suma importância tais como:exames laboratoriais, raio x e evoluções de enfermagem.Artigos e literatura especializada, também foram utilizadas para subsidiar o assunto. De acordo com a taxonomia da Nanda cita-se alguns diagnósticos e intervenções de enfermagem realizadas:Déficit no autocuidado para banho/higiene, relacionado à restrição de movimentos prescritos: avaliar queixas álgicas, dispnéia, diaforese, náuseas, vômitos, alteração de nível de consciência e arritmias; Ansiedade relacionada à mudança de ambiente e ao procedimento cirúrgico;Intervenções: Esclarecidas as dúvidas da paciente sempre que foi necessário **Resultados:** Os resultados obtidos neste estudo favorecem o direcionamento da assistência com base no processo de enfermagem, subsidiam estudos similares e conduzem os profissionais na elaboração de um plano de cuidados individualizado, levando ao fortalecimento da atenção a pacientes que se encontram no período pré-operatório de cirurgia cardíaca e a melhora na qualidade da assistência de enfermagem prestada.

Palavras chaves: paciente, comunicação interatrial(CIA),sistematização de enfermagem (SAE)

AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ÚLCERAS POR PRESSÃO E AS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM IMPLEMENTADAS A PACIENTES NEUROCIRÚRGICOS DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA.

Maria Elizabeth de Araujo Penha[5]
Daniel Bruno Resende Chaves[6]

INTRODUÇÃO: As Úlceras por Pressão (UP) são lesões que tem como etiologia o aumento de pressão em uma dada parte do corpo, geralmente proeminências ósseas. Pacientes Neurológicos estão vulneráveis ao aparecimento da UP, devido as sequelas motoras que os mesmos apresentam, prejudicando a mobilidade e causando muitas vezes a restrição do paciente ao leito. **OBJETIVOS:** Acompanhar o risco para desenvolvimento de Úlceras por Pressão e intervenções de enfermagem implementadas em pacientes neurocirúrgicos de um Hospital terciário especializado em traumatologia. **METODOLOGIA**: Pesquisa do tipo observacional, descritivo, longitudinal e quantitativo. O estudo será desenvolvido com pacientes acometidos por trauma neurológico internados em um hospital terciário especializado em traumatologia. Os critérios de inclusão serão possuírem diagnóstico médico de trauma raquimedular e cranioencefálico, possuírem mais de 18 anos e estarem internados em unidades de cuidados intermediários ou intensivos. O levantamento dos dados será realizado pela autora e com apoio de instrumento estruturado compondo itens da escala de Braden e fatores de risco levantados na literatura, bem como informações clinicas relevante. A coleta de dados somente será iniciada mediante aprovação em comitê de ética em pesquisa e anuência da instituição. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se identificar as lacunas na assistência que possam estar determinando um incremento na incidência de UP nesta instituição. **CONCLUSÃO:** Sabidamente a incidência de úlceras por pressão na população de pacientes neurológicos é alta. A enfermagem tem papel fundamental na identificação dos riscos e intervenção neste para que se possa evitar o surgimento da úlcera.

PALAVRAS CHAVES: Úlceras por Pressão, Escala de Braden, Traumas Neurológicos.

[5] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[6] Docente do Curso de Enfermagem

MARCADORES BIOQUÍMICOS DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Izaque Marques Pereira, Regileudo Gama da Silva,Talita Alves Lima de Mendonça,Tayanne Araújo de Amorim, Yanne Xenofonte Brito Siebra[7]
Mariana Brito Dantas[8]

INTRODUÇÃO: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a necrose do tecido cardíaco devido à oferta inadequada de oxigênio ao músculo cardíaco.O diagnóstico laboratorial é realizado através da dosagem de enzimas e proteínas: troponina, creatinoquinase total (CK-total), creatinoquinase fração MB(CK-MB), mioglobina, AST/TGOe LDH.**OBJETIVO**: Descrever os marcadores bioquímicos do IAMe sua importância no diagnóstico laboratorial. **METODOLOGIA**: Foi realizada pesquisa bibliográfica em fontes secundárias, analisando os resumos e os artigos na íntegra, escolhendo-se os artigos que tratavam sobre os marcadores de forma geral e sobre as troponinas, a CK-MB e a mioglobina. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os principais marcadores bioquímicos são as troponinas I e T, a creatinoquinase fração MB (CK-MB), a mioglobina, AST/TGO e a LDH. As enzimas AST/TGO e LDH foram inicialmente utilizadas como principais marcadores cardíacos, mas devido à sua inespecificidade e baixa sensibilidade não são empregadas no diagnóstico do IAM. A CK-MB é uma enzima reguladora da produção de fosfato no tecido cardíaco e esquelético, devido a isso não ser específica. Afere-se a CK-MB através de testes imunológicos com anticorpo anti-CK-MB, dosando a concentração enzimática da CK-MB (ng/ml), melhorando sua sensibilidade clínica, sua especificidade analítica e sua rapidez na realização do exame. A mioglobina é uma proteína citoplasmática de baixo peso molecular presente nos músculos esqueléticos e cardíacos. Começa a se elevar entre 1 e 2 h após o início dos sintomas, com pico entre 6 e 9 h e normalização entre 12 e 24 h. Pode estar alterada na presença de lesões musculares, insuficiência renal crônica, exercícios extenuantes, exposição a drogas e toxinas, tendo seu valor clínico limitado. As troponinas existentes são a troponina I (TnI), troponina C (TnC) e troponina T (TnT), sendo as isoformas utilizadas no diagnóstico do IAM a TnI e TnT. Após o infarto elas aumentam dentro de cerca de 2 a 4 horas, alcançando o pico sistêmico por volta de 12 horas, mantendo-se elevada por 4 a 7 dias (TnI) e 10 a 14 dias (TnT). **CONCLUSÃO**: As troponinas, especialmente a TnI, e a CK-MB, junto com a mioglobina, são os principais marcadores usados no diagnóstico laboratorial do IAM.O diagnóstico do IAM deve ser realizado através da interpretação dos valores encontrados nos exames, nas alterações presentes no ECGno histórico familiar.

PALAVRAS CHAVES: Infarto do Miocárdio. Diagnóstico. Troponinas. Creatinoquinase. Mioglobina.

[7] Acadêmicos do Curso de Farmácia
[8] Docente do Curso de Farmácia

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE PLACENTA PRÉVIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Adriano Peixoto Viana,Andrea de Melo Martins,Henrique Gomes Magalhães, Francisco José Cunha Dias[9]
Denise de Fátima Cunha[10]

INTRODUÇÃO: Placenta prévia é uma complicação obstétrica na qual a placenta está fixada à parede uterina cobrindo parcial ou totalmente a cérvice uterina. Existem três tipos de placenta prévia, de acordo com a localização placentária e seu nível de complexidade durante o período gestacional: total, parcial ou marginal. Sangramento vaginal espontâneo e sem dor aparente pode ser sinal clínico da patologia. Idade materna avançada, usuárias de drogas, anomalias anatômicas ou enfermidades inflamatórias podem ser fatores de risco. **OBJETIVO:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na produção de uma peça anatômica sobre placenta prévia**.** **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica que retratasse com clareza e fidelidade a estrutura de modo geral e acima de tudo as intempériesque são causadas pela placenta prévia. **RESULTADOS:** A amostragem final e seu design rústico e ao mesmo tempo realista mostraram uma noção real percepção significativa das complicações do mau posicionamento da placenta. **CONCLUSÃO:** A utilização da peça anatômica possibilitou uma melhor visualização das alterações que ocorrem no organismo materno decorrentes da placenta baixa, possibilitando assim, uma melhor compreensão das complicações e efeitos negativos para a mão e o bebê, por parte de toda a comunidade acadêmica, sobre o tema.

PALAVRAS CHAVES: Placenta, Descolamento, Anatomia.

[9] Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FAECE
[10] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

OLHOS E OUVIDOS

SILVA, AnaK. X. da, SOUSA, Elainy K. R., LIMA, Jéssica V. de, SILVA, Madna A., OLIVEIRA, Marcielmade S., OLIVEIRA, Rafaella D. N. de[11]
CARVALHO, AnaZ. F. H. T. de[12]

INTRODUÇÃO: Considerando a procura tardia, na maioria das vezes, pelos médicos e a escassez desses profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), exige-se dos enfermeiros o conhecimento sobre tal assunto para que este possa avaliar e, assim, direcionar o paciente de forma correta ao especialista. **OBJETIVOS:** Ensinar como realizar o exame físico dos olhos e orelhas, revisar a anatomia e a fisiologia, esclarecendo dúvidas e questionamentos dos acadêmicos e professores. **METODOLOGIA:** Na I Jornada em comemoração à Semana de Enfermagem promovida pela FAECE foi exposto pelas alunas do 3º semestre de Enfermagem um trabalho direcionado aos docentes e discentes de todos os cursos, principalmente acadêmicos de Enfermagem sobre a anatomia, fisiologia, exame físico e fotos de achados normais e anormais das estruturas a serem examinadas durante o horário da aula. **RESULTADOS:** A apresentação proporcionou a explanação do exame físico que deve ser feito no paciente pelo profissional durante a consulta de enfermagem, visando ensinar a técnica a ser realizada na avaliação do padrão de normalidade de cada estrutura usando os métodos propedêuticos, onde a maioria dos acadêmicos não conheciam os testes a serem realizados para chegar ao padrão de normalidade e desconheciam certos achados anormais. **CONCLUSÃO:** Quando o profissional for avaliar o paciente, atentar para o que foi dito na entrevista, pois no exame físico podemos associar os sintomas referidos com o achado durante o exame.

[11] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[12] Docente do Curso de Enfermagem

FRATURA BILATERAL DE MANDÍBULA: ESTUDO DE CASO

Andréa de Oliveira Nobre Santiago, Mona Lisa Monteiro de Oliveira, Najla Lima Rodrigues[13]
Carla Daniele Mota Rêgo Viana[14]

INTRODUÇÃO: Uma das fraturas mais comuns na região da face é a fratura de mandíbula cujas causas podem ser por agressão física, acidentes de trabalho, práticas esportivas, ferimentos por arma de fogo ou algum tipo de colisão. Existem inúmeras classificações para as fraturas de mandíbula que são: fratura simples, fratura em galho verde e fratura cominutiva. Os sintomas clínicos mais comuns são: Dor, limitação dos movimentos mandibulares, crepitação, alteração da oclusão dentária e desvio de abertura bucal para o lado fraturado. **OBJETIVO:** Identificar as possíveis intervenções a serem realizadas por um enfermeiro na assistência a saúde de um paciente vítima de fratura de mandíbula. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo, exploratório do tipo estudo de caso realizado durante disciplina de Estágio Supervisionado I, com coleta de dados no Hospital Batista Memorial em Fortaleza, na enfermaria da unidade de assistência pós-operatória, sujeito foi um adolescente de 18 anos submetido à cirurgia na mandíbula após colisão com coluna de concreto no dia 12 de março de 2015. Foi executada a entrevista por consentimento livre respeitando autonomia do paciente de acordo com os aspectos éticos em 466/12. **RESULTADOS:** Os diagnósticos de enfermagem encontrados no caso foram: déficit no autocuidado para alimentação, incapacidade, risco de infecção, mucosa oral prejudicada. **CONCLUSÃO:** A importância da enfermagem no pós-operatório adequado ao paciente vítima de traumatismo de mandíbula tem papel essencial nos cuidados a serem prestados, pois o atendimento prioritário visa na estabilização, reabilitação total, segurança do paciente individualmente e integralmente.

PALAVRAS-CHAVE: Mandíbula. Fixação Interna de Fraturas. Cuidados de Enfermagem.

[13] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[14] Docente do Curso de Enfermagem

CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA ANATÔMICA SOBRE GRAVIDEZ ECTÓPICA

Francisca Andrea Martins Freires,Jessica da Silva Rodrigues, Rafaele Reis da Rocha,Sheila Patrícia Diamante da Silva, Sueilany Patrícia da Silva[15]
Denise Fernandes[16]

INTRODUÇÃO: A gravidez ectópica é a principal causa de morte materna no primeiro trimestre da gestação. A palavra ectópica significa "fora de lugar". Ocorre quando o ovo se implanta fora do útero, a incidência é de 1,5 a 2% das gestações, é maior a prevalência nas multigestas sendo que a gravidez tubária representa > 95% das ectópicas. **OBJETIVO**: Relatar a experiência de construir uma peça sobre gravidez ectópica enfatizando o assunto pesquisado. **METODOLOGIA:** A peça foi confeccionada com material de isopor, tinta guache, tendo sido moldada anatomicamente com estilete e lixa, para construção das cavidades uterinas. **RESULTADOS**: Os resultados obtidos foram a compreensão relacionado ao assunto (gravidez ectópica), abordado através da peça e da explanação do grupo. **CONCLUSÃO:** Através do presente relato de experiência observamos que a peça anatômica vem servir de material educativo na promoção e educação em saúde da mulher.

PALAVRA CHAVE: Gravidez ectópica, enfermagem, fatores de risco, diagnóstico e tratamento.

[15] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[16] Docente do Curso de Enfermagem

SEGURANÇA DO PACIENTE

Geisiane Pereira Maia[17]
Helane Gonçalves Rocha[18]

Introdução: A preocupação com a segurança do paciente é uma importante dimensão da qualidade do cuidado, pois a clientela estará sujeita à hospitalização para receber assistência durante o processo de internação onde os cuidados de enfermagem são oferecidos e será essencial para atender as necessidades e obter uma boa qualidade do cuidado prestado, obtendo uma perspectiva que dependerá da competência dos profissionais, coleta de dados, mecanismos de identificação, administração segura e procedimentos corretos, aprimorando a efetividade de suas ações. **Objetivo:** avaliar a principal preocupação com a qualidade do cuidado e com a segurança do paciente nas instituições de saúde, garantir a melhoria na assistência, higienização adequada, cirurgia segura, segurança do tratamento cirúrgico dos profissionais, administração segura, comunicação efetiva dos profissionais que atuam tendo um conhecimento especifico e diminuição de possíveis agravos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, onde será desenvolvido para o trabalho de conclusão de curso, o local da pesquisa será no hospital e maternidade, localizado no interior da cidade de Cascavel-Ceará, os participantes do estudo serão técnicos de enfermagem, enfermeiros que atuam na unidade e estudantes do último semestre do curso de graduação de enfermagem que aceitarem participar. **Resultados Esperados:** Será feita uma análise dos dados selecionados, avaliando, observando a preocupação, compreensão e conhecimento dos participantes abordando sobre o assunto á temática da segurança do paciente levando em consideração as politicas de qualidade em saúde.

Palavra Chave: Segurança do Paciente, Coleta de Dados, Cirurgia Segura.

[17] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[18] Docente do Curso de Enfermagem

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA VÍTIMA DE FRATURA: UM ESTUDO DE CASO

Elainy Karen Rios Sousa, Jéssica Valesca de Lima, Rafaella Dandara Nunes de Oliveira[19]
Ana Zaiz Flores Hormain Teixeira de Carvalho, Yandara Alice Ximenes Bueno de Carvalho[20]

INTRODUÇÃO: Os acidentes são considerados como um evento previsível, resultando em uma transmissão rápida de um tipo de energia dinâmica, térmica ou química de um corpo a outro ocasionando danos e até a morte. Os acidentes representam uma das principais causas de internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em crianças de 0 a 14 anos, sendo a queda o acidente mais frequente, apresentando 48% das internações hospitalares em 2012. **OBJETIVO:** Discutir a assistência de enfermagem a ser prestada a um paciente vítima de fratura no úmero, internado para tratamento cirúrgico. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma visita técnica em um hospital no município de Caucaia/CE no dia 05/09/14 pelas acadêmicas do 6º semestre do curso de Enfermagem, onde foi coletado dados sobre o caso a ser exposto. **RESULTADOS:** Paciente admitido na unidade hospitalar com fratura supra-condiliana no úmero direito, submetido à correção cirúrgica. **DISCUSSÃO:** SAE voltado a um paciente vítima de queda. Histórico: F. M. S. G., 6 anos, sexo masculino, vítima de queda escolar, resultando em fratura no úmero direito. Diagnóstico de Enfermagem: Mobilidade física prejudicada relacionado a trauma no membro superior direito. Planejamento: Conscientizar o paciente e os pais sobre o agravo à sua saúde. Implementação: Orientar os pais sobre a importância da nutrição adequada para a cicatrização óssea. **CONCLUSÃO:** Detectamos a necessidade de serem realizadas ações educativas nas escolas com docentes e educandos visando a prevenção dos acidentes causados no ambiente escolar.

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem; Acidente escolar; Criança na Primeira Infância; Fratura.

[19] Acadêmicas do Curso de Enfermagem
[20] Docentes do Curso de Enfermagem

QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

Luciana Alyne Cavalcante Rebouças[21]
Annunziata Cunto de Vasconcelos[22]

A assistência prestada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode resultar em alterações na saúde dos trabalhadores. Este é um estudo descritivo, tendo como objetivo analisar os estudos publicados acerca da qualidade de vida e condições de trabalho dos profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência. Foi realizada a busca nas bases de dados Lilacs, Scielo e Bireme na Biblioteca Virtual de Saúde, encontrando-se 10 artigos sobre os temas, após filtrar com os critérios de inclusão da pesquisa, nos meses de março e abril de 2015. Percebeu-se que 61,4% dos trabalhos publicados foram por profissionais da saúde, principalmente enfermeiros. Percebe-se temas outro emprego, 48% dos trabalhos ressaltavam o esforço desses profissionais, como realizar hora extra e 25,3% relatam o excesso e sobrecarga do horário de trabalho, sendo muitas vezes mais de 70 horas semanais. Dentre os estudos, apenas 23% ressaltavam que esses profissionais têm tempo para praticar atividade física e de lazer, e ressaltavam ainda os problemas acarretados por isso, sendo desde afastamento até transtornos mentais e outras doenças adquiridas por excesso de tensão do trabalho. Deve-se assim ter um olhar diferenciado para os profissionais da assistência pré-hospitalar que trabalham sob pressão, e inseri-los nos nas práticas de prevenção e promoção da saúde.

Palavras Chave: Serviços Médicos de Emergência; Auxiliares de Emergência; Ambulâncias.

[21] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[22] Docente do Curso de Enfermagem

O USO DO DNA RECOMBINANTE NA PRODUÇÃO DE INSULINA ARTIFICIAL

Aline Moreira de Sousa, Ana Carla Pereira de Queiroz, Francisco Josimar Isabel Cristina Flor de Oliveira Silva, Jailson Ribeiro de Castro, João Paulo Abreu, Maria Elane Sousa Nascimento, Kaciana Mariano de Castro[23]
Profa. Alba Fabiola F. C. Torres[24]

INTRODUÇÃO: A tecnologia do DNA recombinante proporciona produção de insulina artificial, trazendo enorme avanço na área da medicina. Moléculas de DNA artificial contendo segmentos covalentes ligados, derivados de duas ou mais fontes, são chamados de DNA recombinante (Lehninger, 2011). **OBJETIVOS:** Informar e discutir sobre as técnicas usadas na produção de insulina artificial, utilizando se a técnica de DNA recombinante e esclarecer a importância desse hormônio no tratamento de pessoas com Diabetes Mellitus tipo I ou insulino dependentes**. METODOLOGIA:** Este presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados artigos e teses. Após a coleta de dados, todas as informações pertinentes foram selecionados e ordenados. **RESULTADOS:** Segundo (Nardi, 2002), a clonagem de DNA segue cinco procedimentos gerais: cortar o DNA no local preciso (enzimas de restrição), unir dois fragmentos do DNA covalentes (DNA ligase), selecionar uma pequena molécula de DNA capaz de autorreplicação. Segundo Lehninger (2011)através do uso de enzimas de restrição, isola-se o fragmento de DNA humano responsável pela síntese de insulina. Também através do uso desse tipo de enzima rompe-se o DNA plasmidial das bactérias. Utilizando a DNA ligase, enzima capaz de refazer as ligações de DNA, refaz-se o DNA dos plasmídeos das bactérias, introduzindo o DNA humano. Com o DNA humano incorporado, a bactéria *Escherichia coli,* modificada geneticamente, torna-se capaz de sintetizar insulina humana. **CONCLUSÃO:** O uso dessa nova tecnologia do DNA recombinante aplicada na produção de insulina artificial traz grandes benefícios no tratamento de pacientes que sofrem de DM tipo I, o qual é um sério problema de saúde pública em todo mundo.

Palavras chave: DNA, DNA recombinante, DNA ligase, Insulina,*Escherichia coli*.

[23] Acadêmicos do Curso de Farmácia
[24] Docente do Curso de Farmácia

BENEFÍCIOS DA TERAPIA A VÁCUO DENTRO DO PROCESSO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DAS LESÕES EM PÉ DIABÉTICO

Mona Lisa Monteiro de Oliveira[25]
Rosilane Gomes dos Santos Paixão[26]

INTRODUÇÃO: O estado hiperglicêmico crônico que é causado pelo tempo de exposição a Diabetes Mellitus (DM) leva ao grande número de feridas diabéticas crônicas e uma alta incidência de amputações nos membros inferiores. A indústria hoje pesquisa produtos que possam ser usados na tentativa de amenizar a amputação dos membros de pacientes diabéticos. Atualmente já temos um tipo de curativo oclusivo realizado através da terapia a vácuo. **OBJETIVO:** Mostrar a importância da Terapia a vácuo ou o fechamento assistido a vácuo dentro do processo de tratamento e reabilitação das lesões do pé diabético. **METODOLOGIA:** O estudo é do tipo descritivo com abordagem quantitativa através de fatos naturais descritos e realizado com 20 pacientes diabéticos sendo homens e mulheres com idade de 40 á 60 anos que por acidente, descuido ou tempo de doença encontram se com algum tipo de lesão no seu membro inferior (perna, pés e dedos). **RESULTADOS ESPERADOS:** Monitorar a ferida diabética no seu processo de cicatrização, utilizando a terapia a vácuo observando o tempo de cicatrização, o tempo de terapia e se houve melhora da ferida impedindo assim a amputação do membro afetado, levando a redução da porcentagem do número de amputações. **CONCLUSÃO:** Em virtude dos fatos mencionados sobre a grande incidência de amputação de feridas em diabéticos por causa das graves complicações que o pé diabético traz aos pacientes, levando a amputação de seus membros, faz-se necessário o acompanhamento do processo de cicatrização dessas feridas.

PALAVRAS-CHAVE: Amputação, Cicatrização, Ferimentos e lesões e Pé Diabético.

[25] Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da FAECE
[26] Docente do Curso de Fisioterapia da FAECE

ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE HOSPITALIZADO: O PALHAÇO NO HOSPITAL COMO ESTRATÉGIA PARA HUMANIZAÇÃO

Eslane Costa do Nascimento[27]
Georgiana de Alencar Portela[28]

Introdução: O processo da internação pode gerar impactos devastadores na vida de qualquer ser humano tornando-se importante a criação de estratégias terapêuticas a fim de promover o bem estar e atender às dimensões físicas, psíquicas, culturais, espirituais, sociais e intelectuais, favorecendo a expressão do paciente e possibilitando a humanização e valorização do sujeito inserido no contexto hospitalar (BRASIL e SCHWARTZ, 2005). O riso é comparado a um "aminoácido essencial" para o organismo, entrando no conceito do "humor terapêutico".**Objetivo:** Rrefletir o riso como uma alternativa terapêutica na recuperação do paciente. Mostrar que essa abordagem cômica contribui para atenuar o estresse experimentado pelos pacientes/ acompanhantes durante a internação – por interferir em sua rotina – e reduzir o tempo de confinamento através de um meio terapêutico. **Metodologia:** Pesquisa qualitativa de cunho exploratório, transversal, onde serão usados como instrumento um questionário e um roteiro de entrevista semi-estruturado, a ser realizado no Hospital de referência Infantil Albert Sabin no ano de 2015. **Resultados:** Mostrar que o brincar dentro do hospital é um elemento importante no que diz respeito ao desenvolvimento, saúde e bem estar do enfermo e que as atividades lúdicas podem contribuir atuando como uma ferramenta facilitadora no processo de tratamento, sendo mais uma ferramenta terapêutica no seu processo de recuperação. **Conclusão:** Compreende-se que, através desta terapia, ocorre uma melhora dos pacientes e do ambiente hospitalar tornando este mais agradável para aqueles enfermos que procuram conforto e para a equipe de saúde que trabalha de forma mais humanizada.

Palavras chaves: Humanização. Recuperação. Terapia.

[27] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[28] Docente do Curso de Enfermagem

DEPRESSÃO EM IDOSO INSTITUCIONALIZADO: PERCEPÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE.

Francisca Talyta Rodrigues de Sousa[29]
Georgiana de Alencar Portela[30]

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Para efeito de formulação de políticas públicas, esse limite mínimo pode variar segundo as condições de cada país. O envelhecimento é caracterizado muitas vezes por desestruturação orgânica e aumento de doenças acarretando fragilidade nesse processo, sendo a depressão o quarto maior agente incapacitante das funções sociais e atividades de vida cotidiana, é um transtorno comum em idosos, aumentando a sua prevalência naqueles institucionalizados. **OBJETIVO:** Descrever a percepção sobre depressão da equipe multidisciplinar nos idosos institucionalizados, identificando o perfil do idoso conhecendo a realidade da instituição. **METODOLOGIA:** O estudo será de natureza qualitativa onde possibilite uma análise discursiva, para compreender a avaliação do grau de conhecimento da equipe em saúde ao paciente idoso com depressão. Onde será realizada uma pesquisa em uma instituição de médio porte na cidade de Fortaleza-Ce com profissionais que compõe a equipe. **RESULTADOS ESPERADOS:** Mostrar que o conhecimento da equipe de saúde na percepção da depressão no idoso, em situação de fragilidade é essencial, para que através desse acompanhamento tenha um diagnóstico eficaz no paciente.

PALAVRAS CHAVES: Idoso institucionalizado, Envelhecimento, Depressão.

[29] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[30] Docente do Curso de Enfermagem

CONSTRUÇÃO DE PEÇA SOBRE PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Clissylene Ferreira, Geisa Veras, Jamerson Rodrigues, Rafaela Barbosa, Tarcila Nunes[31]
Denise Fernandes[32]

INTRODUÇÃO: Conhecida como doença hipertensiva específica da gestação é detectável após a 20ª semana de gestação, e caracteriza-se pelo desenvolvimento gradual de hipertensão, pressão arterial maior ou igual a 140x90 mmHg, em pacientes previamente normotensas, associada à proteinúria e/ou edema generalizado (OLIVEIRA-2006). **OBJETIVO:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre síndromes hipertensivas na gestação pré-eclâmpsia e eclampsia. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no mês de abril do ano corrente, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem do 5° semestre, na confecção da peça anatômica sobre pré-eclâmpsia e eclampsia. **RESULTADOS:** A construção da peça anatômica é composta de peça única divida em duas partes, representando a placenta e os efeitos da pré-eclâmpsiana mesma. **CONCLUSÃO:** A peça anatômica possibilitou a compreensão dos efeitos da pré-eclâmpsia na placenta e sua influência na perfusão uteroplacentária para o crescimento do feto.

PALAVRAS – CHAVE: Pré-eclâmpsia, Eclampsia, Gravidez.

[31] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[32] Docente do Curso de Enfermagem

ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS: ANÁLISE DE ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO

Josilene Uchôa Andrade[33]
Ana Zaiz Carvalho[34]

INTRODUÇÃO: O Diabetes *Mellitus* (DM) definido como uma patologia de alcance metabólico corroborou acendendo a mudança epidemiológica de doenças crônico-degenerativas no mundo. Compreendendo que o DM demanda um cumprimento dos pacientes para com as sugestões e prescrições dos profissionais por todo vida, tornando o autocuidado, um componente importante para evitar complicações futuras, o enfermeiro revela-se como um facilitador educando em saúde e diagnosticando necessidades de autogestão. **OBJETIVO GERAL:** Discutir os principais fatores responsáveis pela não adesão ao regime terapêutico. **METODOLOGIA:** O estudo se desenvolverá na cidade de Maranguape, região nordeste do Brasil, mais precisamente em uma Unidade Primária de Saúde (UPS), empregará um formulário para coleta de dados sociodemográficos e para avaliar as atividades de autocuidado exercidas pelos pacientes com Diabetes utilizaremos o *Summaryof Diabetes Self-CareActivities Questionnaire* (SDSCA) adaptado para nossa língua portuguesa. **RESULTADOS:** Aspiramos contribuir seguramente para a melhora da qualidade de vida dos portadores do DM, inferindo intervenções de enfermagem que influencie na mudança de estilo de vida e promoção da autogestão da doença, através da avaliação dos dados e comparação de variáveis. **CONCLUSÃO:** Confiamos que através deste estudo iremos ajudar efetivamente á equipe de saúde da família na assistência ao portador de Diabetes, indo de encontro á melhores resultados no tratamento e maiores índices de adesão, beneficiando e enriquecendo a atuação do enfermeiro junto ao diabético.

PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado. Enfermagem em saúde comunitária. Diabetes Mellitus.

[33] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[34] Docente do Curso de Enfermagem

AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DE PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MARACANAÚ – CE

Daniele de Sousa Araujo[35]
Mariana Brito Dantas[36]

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma doença bastante comum em nosso país e, geralmente só é detectada quando sofre um infarto ou em exames de rotina médica isto por que geralmente os pacientes são assintomáticos. Esta doença é caraterizada por níveis tensionais elevados, associados a alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos ambientais. Ela é definida clinicamente como limítrofe quando alcança 140/90 mmHg, e a hipertensiva quando atinge 165/95 mmHg. **OBJETIVO** : Analisar os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, bem como as complicações causadas por esses fatores em pacientes hipertensos, na rede pública, que participam dos grupos de hipertenso e diabetes da unidade básica de saúde da família, em Maracanaú - CE. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo retrospectivo e documental, realizado na unidade básica de saúde da família Alberto Assad Bardawil, em Maracanaú – CE,. A coleta de dados ocorreu nos prontuários dos pacientes que são considerados hipertensos, comprovado pela apresentação de documentos que possui no prontuário. **RESULTADOS**: Foi verificado que um grande número de pacientes estava com IMC acima do normal. O maior percentual de hipertensos estava com hipertensão sistólica. Certo que, para o controle da hipertensão não se faz necessário somente uma terapêutica medicamentosa adequada, como também os hipertensos melhorem seus hábitos alimentares, através de orientações do profissional farmacêutico, para ter um estilo de vida com mais qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: hipertensão, fatores de risco e estilo de vida.

[35] Acadêmica do Curso de Farmácia
[36] Docente do Curso de Farmácia

ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ANTINEOPLÁSICOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO A PARTIR DOS INDICADORES DE PRODUTIVIDADE.

Patrícia Sayonara Lima de Castro[37],
Aronai Salmon da Cruz Lobato[38]
Lana Karine Vasconcelos Barroso[39]

INTRODUÇÃO: O Serviço de manipulação de antineoplásicos é mais uma atividade desempenhada pelo farmacêutico no âmbito hospitalar, que, dentre suas atividades, envolve o recebimento e avaliação das prescrições, bem como separação, manipulação e dispensação dos medicamentos. Considerando a relevância do serviço na terapêutica do paciente, fez-se necessário avaliá-los, com o objetivo de busca pela a sua qualidade. **OBJETIVOS:** Objetivou-se descrever o setor de manipulação de antineoplásicos a partir dos indicadores de produtividade. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quali-quantitativa, com coletas de dados a partir dos registros de um banco de dados elaborado pela farmácia de quimioterapia do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), o estudo envolveu dados relativos ao período de janeiro a dezembro de 2014, os quais foram submetidos à análise quantitativa no Microsoft Excel 2010. **RESULTADOS:** Os dados obtidos foram estruturados a partir do estudo de indicadores de produtividade por via de administração, sendo identificadas as vias de administração Endovenosa (69%), oral (16,1%), subcutânea (9,5%), intramuscular (3,9%), intratecal (1,4%).Quando avaliado o setor atendido, identificou-se 36,6% no Ambulatório de Hematologia, 24,1 % Oncologia, 22 % Clínicas, 1,3% Reumatologia. Dentre os medicamentos manipulados tem-se a Ciclofosfamida que representa (8%), Etoposídeo (4%), Fluorouracil (6%), Metotrexato (6%) e a Oxaliplatina (1,5%). **CONCLUSÃO:** Percebeu-se a importância do setor destacando sua produtividade, e estes dados futuramente podem servir como base de um planejamento estratégico para uma distribuição igualitária no setor. Ressalta-se a necessidade do levantamento de indicadores de qualidade para uma adequada avaliação no serviço.

Palavras-chave: Manipulação. Antineoplásicos. Quimioterapia. Indicadores de produtividade. Avaliação de serviço.

[37] Acadêmica do Curso de Farmácia
[38] Farmacêutico Coordenador da Central de Misturas Intravenosas do HUWC
[39] Docente do Curso de Farmácia

QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES QUE AMAMENTAM: PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS

Aparecida Alessandra Santiago de Oliveira[40]
Juliana Vieira Figueiredo[41]

INTRODUÇÃO: A prática de aleitamento materno é uma experiência singular na vida da puérpera, influenciada por sua cultura e valores sociais. Neste contexto, observa-se que o aleitamento materno é uma atividade que promove inúmeros benefícios para a saúde materno-infantil, entretanto, as alterações e dificuldades vivenciadas pela puérpera neste período podem influenciar em sua qualidade de vida e comprometer a continuidade da amamentação. **OBJETIVO:** Identificar e descrever a percepção de mulheres que amamentam acerca de sua qualidade de vida no puerpério. **MÉTODOS:** Será realizado um estudo descritivo, exploratório, de caráter qualitativo, em uma Unidade Básica de Saúde do município de Fortaleza/CE, pertencente à regional III. O estudo será desenvolvido com puérperas maiores de 18 anos em aleitamento materno exclusivo e que estiverem com mais de 10 dias de pós-parto. Serão excluídas aquelas que apresentarem intercorrências clínicas puerperais ou transtorno mental. Os dados serão coletados por visita domiciliar. Serão realizadas entrevistas individuais por meio de um roteiro semi-estruturado contendo perguntas abertas, abordando dados socioeconômicos, antecedentes obstétricos e aspectos relacionados aos objetivos deste estudo. A coleta de dados prosseguirá até o momento em que ocorrer a saturação dos dados. Esta pesquisa atenderá aos preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos conforme resolução 466 de 2012. **RESULTADOS ESPERADOS:** A partir da identificação da percepção de nutrizes acerca de sua qualidade de vida no puerpério será possível o planejamento e implementação de cuidado de enfermagem eficaz para promoção da qualidade de vida de puérperas, o que poderá contribuir para manutenção e continuidade do aleitamento materno.

Palavras Chave: Aleitamento Materno; Qualidade de Vida; Período Pós-Parto.

[40] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[41] Docente do Curso de Enfermagem

PLANTAS MEDICINAIS USADAS COMO HIPOGLICEMIANTES EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS.

Camila Galdino de Sá, Elayne Tavares de Oliveira,
Siuanne Fernandes Rodrigues[42]
Mariana Dantas[43]

A diabetes mellitus não é uma doença única, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum à hiperglicemia e pode estar associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros. (Caderno de Atenção Básica nº16 – 2006).

Existe várias formas de diabetes mellitus, são a do tipo 1 que antes era conhecida como diabetes juvenil que seu número esta entre 5% a 10% dos caso, já a do tipo 2 ou diabetes adulta assim chamada, é a mais frequente 90% a 95% dos diabéticos e a gestacional que estar presente durante o período gestacional, é de 1% a 14% das gestantes.

A diabetes mellitus tipo 2 é usada para designar uma deficiência relativa de insulina. A incapacidade da célula beta em responder à crescente demanda periférica de insulina (observada durante a evolução progressiva da insulinorresistente em indivíduos intolerantes a glicose). A hiperglicemia do DM2 resulta de dois mecanismos básicos a resistência periférica a ação da insulina e a deficiência da produção deste hormônio pela as células beta do pâncreas. Na resistência insulínica, os receptores da membrana celular não conseguem reconhecer o sinal dado pela insulina e sua função não pode ser exercida. A causa dessa resistência pode ser genética ou fatores ambientais como, por exemplo, hábitos alimentares.

A insulina é produzida no pâncreas, nas células beta da ilhota de Langerhans, cuja função é transportar a glicose até as células do corpo para que esta seja transformada em energia. A ocorrência de falhas neste mecanismo resulta no aumento de glicose no sangue, levando a uma hiperglicemia e consequentemente afetando a homeostase do organismo. A perda de função da célula β é um fator que aparece precocemente no desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. Em condições normais a secreção insulínica ocorre em dois picos ao se iniciar uma refeição: o primeiro pico é necessário para a utilização da glicose proveniente dos alimentos e também para sinalizar o fígado e inibir a produção endógena de glicose logo após a refeição. No segundo pico, a insulina atua na captação da glicose pelas células. No indivíduo sadio, as duas fases de secreção de insulina estão preservadas, enquanto no portador de diabetes mellitus há perda da primeira fase e atraso na segunda fase desse processo. Nesse caso, não se faz necessário o uso de insulina como forma de tratamento, mas para manter o controle metabólico muitos precisam utilizá-la de forma exógena, já que muitas vezes o pâncreas se torna incapaz de produzir este hormônio em quantidade suficiente.

Após o diagnóstico do DM2, com exames laboratoriais como glicemia em jejum, teste oral de tolerância à glicose (TTG-75g) e glicemia casual, é iniciado o uso de

[42] Docentes do Curso de Farmácia
[43] Docente do Curso de Farmacia

hipoglicemiantes orais. Não havendo redução dos níveis glicêmicos é indicada a utilização de insulina individualmente ou associado aos antidiabéticos orais.

No entanto, observa-se que hoje em dia, mesmo com a crescente demanda de fármacos sintéticos para o tratamento das mais diversas enfermidades muitas pessoas ainda vão ao mais antigo método de tratamento utilizado, a base de plantas medicinais. Muitas pessoas além de utilizar o controle da alimentação como tratamento e/ou prevenção da diabetes mellitus também utilizam as plantas medicinais.

O Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo, com grande destaque para flora brasileira. Dentre toda essa riqueza destacamos as plantas medicinais que há muito tempo faz parte do cotidiano de muitas pessoas que buscam o tratamento e/ou prevenção de doenças. Entende-se por plantas medicinais aquelas que procuram amenizar ou curar doenças, sendo tradicionalmente usadas como medicamentos por uma determinada população ou comunidade local, servindo de base para confecção de fitoterápicos e subsídios para outros fármacos. Algumas destas plantas são tradicionalmente utilizadas como hipoglicemiantes no manejo da DM2 e as que têm seus efeitos hipoglicemiantes comprovados são: a). Baccharistrimera (Less) Dc. (Carqueja); b). Syzyguimcumini (L.) Skeels (jambolão); c). Averrhoa carambola L. (carambola); d). Passiflora edulis f. FlavicarpaDeg. (maracujá).

Plantas usada sem efeitos hipoglicemiantes comprovados: a). Bauhiniaforficata Link (pata-de-vaca); b). Phyllanthusniruri L. (quebra-pedra).

A maioria das plantas que são usada com antidiabéticos ao serem avaliadas farmacologicamente demonstraram ter atividade hipoglicemiante e possuir constituintes químicos que podem ser utilizados como modelos para novos hipoglicemiantes. Entretanto, análises posteriores revelaram grande variedade de mecanismos de ação que podem levar ao efeito hipoglicemiante, nem todos terapeuticamente úteis. Muitas dessas plantas podem provocar a acidentes hipoglicêmicos.

O mecanismo de ação pelos quais as plantas baixam a taxa de glicose do sangue pode ser atribuído aos seguintes fatores:

aumento da liberação de insulina através da estimulação das células beta pancreáticas;
resistência aos hormônios que aumentam a taxa de glicose;
aumento do número e da sensibilidade do sítio receptor de insulina;
diminuição da perda de glicogênio;
aumento do consumo de glicose nos tecidos e órgãos;
eliminação de radicais livres;
resistência a perioxidação de lipídeos;
correção da desordem metabólica causada em lipídeos;
proteínas e estímulo ao aumento de microcirculação do sangue no organismo.

Algumas plantas associadas ao tratamento de diabetes são consideradas tóxicas. Há muitos efeitos tóxicos das plantas, os quais podem resultar em hipoglicemia, tais como, hepatotoxidade e bloqueio das β – adrenérgico.

A toxicidade pode ser influenciada pela parte usada na preparação do extrato, método de preparação e rota de administração. A alergenicidade e fotossensibilização são outros aspectos de toxicidades, os quais não são revelados nos teste de toxicidade aguda e que ainda representam riscos significativos.

Para melhor eficácia no uso de plantas é necessário atentar para identificação correta dos mesmos. Outra questão a ser observada acerca do uso de plantas medicinais é se atentar para automedicação. As plantas quando usadas corretamente são medicamentos

quando associada a outros fármacos e por consequência podem causar um efeito indesejável no tratamento de qualquer patologia.

Concluímos que a utilização de plantas medicinais, por mais natural que seja, pode apresentar risco à saúde da população, assim como qualquer outro medicamento. No caso dos pacientes diabéticos deve-se haver o acompanhamento médico e este deve estar ciente da utilização desse tipo de tratamento pelos portadores de diabetes por conta do risco da má utilização destes e por muitas plantas medicinais não terem seus efeitos comprovados cientificamente.

CONFECÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PERI OPERATÓRIO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO CEARÁ.

Sousa, Auricélio Felício de Gonçalves[44]
Maria Helane Rocha[45]

INTRODUÇÃO: O termo Peri operatório é utilizado para descrever todo o período que compreende a cirurgia. As três fases dos cuidados Peri operatórios são: Pré-Operatório, trans-operatório e pós-operatório. Desde o momento em que o paciente sabe de seu diagnostico até sua recuperação. Portanto, a assistência de enfermagem no centro cirúrgico é de fundamental importância, pois assegura uma assistência integral e individualizada com qualidade e segurança ao paciente, analisando todo o seu processo hospitalar. **OBJETIVO:** O presente estudo tem como objetivo criar um instrumento de análise voltado para o SAEP (Sistematização da Assistência de Enfermagem Peri operatória) e implementar o mesmo no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro localizado no município de Cascavel no estado do Ceará. **METODOLOGIA:** a elaboração do instrumento será fundamentada em estudos de artigos científicos pertinentes ao assunto disponíveis nas bases de dados BIREME no período de 2005 até o ano de 2015. **RESULTADOS**: Esperamos que SAEP possa assim contribuir para uma assistência de enfermagem sistematizada e individualizada. **CONCLUSÃO:** Conclui-se nesse contexto que a assistência sistematizada no Peri operatório, deve ser imprescindível para o sucesso de todo o processo cirúrgico.
PALAVRAS CHAVES: Peri operatório. Enfermagem. SAEP.

[44] Acadêmico do Curso de Enfermagem
[45] Docente do Curso de Enfermagem

APÓS UM TRAUMA - A EPOPÉIA DE UM ATENDIMENTO: UM ESTUDO DE CASO

Juliana Ferreira, Valdelúcia Rebouças, Vera Lucia Almeida[46]
Alexandre Araújo Freitas[47]

INTRODUÇAO: O trauma é definido como qualquer lesão de tecido, órgão ou parte do corpo, causada subitamente por um agente físico e de origem externa. Representa um sério problema social. Esta estatística tem impelido os serviços de atendimento no Brasil a se organizarem para atender estes pacientes. **OBJETIVO :** Descrever as fases de um atendimento, atuação da Enfermagem e as implicações para a população e serviços de saúde, e analisar a atuação da Equipe e apresentar como poderia ser este acolhimento. **METODOLOGIA:** O estudo fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica, e de campo, com estudo de caso realizado em hospital da cidade de Fortaleza-Ce, tendo como instrumento de coleta de dados o prontuário do paciente atendido no dia 13 de abril de 2015. **RESULTADOS ESPERADOS:** Políticas Públicas para a prevenção, redução e melhorias na organização dos serviços de saúde que garantem às vítimas de trauma quando indicado, hospitalização em unidade de internamento e não permaneçam longos períodos na unidade de emergência à espera de vaga. **CONCLUSAO:** Espera-se maior investimento do Estado para o atendimento adequado das vítimas de trauma, políticas públicas efetivas e consequentemente, a redução da morbimortalidade associada.

Palavras chave: Trauma, Atendimento, Enfermagem

[46] Acadêmico do Curso de Enfermagem
[47] Enfermeiro/Supervisor do Curso de Enfermagem

DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL

Lorena Maia Morais, Maria Valdilene Monteiro de Oliveira, Maria das Graças Cândido Cardoso, Mary Lane Costa Bezerra.

INTRODUÇÃO: A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é definida como um grupo de estados gestacionais e neoplásicos que derivam do trofoblasto. Ela é dividida em: mola hidatiforme (parcial ou completa), mola invasiva, coriocarcinoma e tumor trofoblástico de sítio placentário. A DTG engloba grupo heterogênio de proliferação celular originada a partir do epitélio trofoblástico placentário, com formas clínicas benignas, representadas pela mola hidatiforme completa e parcial, e por formas malignas, representadas pela mola invasora, coriocarcinoma e tumor trofoblástico do sítio placentário, agrupados sob o epitélio de neoplasia trofoblástica, não só porque podem colocar em risco a vida das mulheres em idade fértil, mas também pela sua alta taxa de cura se tratados precocemente. A forma mais comum da doença trofoblástica gestacional é chamada mola hidatiforme, também conhecida como gravidez molar. **OBJETIVO:** Relatar experiência da construção da peça anatômica sobre a doença trofoblástica gestacional. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo de relato de experiência, realizado no dia 28 de abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre Doença Trofoblástica Gestacional. **RESULTADOS**: Foi construída uma peça anatômica que mostra o interior do útero e a localização do tumor trofoblástico com um feto inviável, demonstrando assim uma gravidez molar. **CONCLUSÃO:** Portanto, na visualização da peça anatômica e na explicação sobre a patologia podemos instruir a comunidade acadêmica e conscientizar sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVES: Doença trofóblastica gestacional, mola hidatiforme, DTG,

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PARA O PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Elainy Karen Rios Sousa
Jessica Valesca de Lima
Raquel Silveira Mendes

INTRODUÇÃO:A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica caracterizada por níveis pressóricos persistentes iguais ou acima de 140 mmHg (pressão arterial sistólica) e 90mmHg (pressão arterial diastólica). **OBJETIVO:** Desenvolver e aplicar o processo de enfermagem ao paciente portador de hipertensão arterial. **METODOLOGIA:** Pesquisa descritiva, sob forma de relato de experiência vivenciado por acadêmicas de enfermagem. O estudo foi realizado durante a disciplina de Estágio Supervisionado I, em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de Fortaleza-Ce, no mês de março de 2015.A coleta de dados foi através de uma entrevista. A análise dos dados foi realizada com base na literatura vigente. **RESULTADOS:** Apresentação do caso: M.E.S.R., 67 anos, gênero: feminino, viúva, católica, natural de Baturité-Ce e procedente de Fortaleza-Ce. Costureira e aposentada, mora com a filha. Compareceu à consulta de enfermagem para aquisição de nova prescrição para continuidade do tratamento de HAS. Durante a consulta foram identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem: Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais, Constipação e Volume de líquidos deficiente. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A prática da consulta de enfermagem permitiu a reflexão sobre seu potencial. A experiência da aplicação do processo de enfermagem proporcionou um olhar ampliado do processo saúde-doença. Consideramos que o cuidado de enfermagem possa atingir a eficiência almejada, é preciso fundamentar as ações em conhecimentos e designá-las de forma habilidosa. É importante que as instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, incluam espaços para discussão de casos clínicos sobre o exercício do cuidado, contribuindo assim para uma aproximação da teoria com a prática.

Palavras Chave: Hipertensão, Cuidados de enfermagem, Diagnóstico de enfermagem.

DIAGNÓSTICO DE DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ (DHEG): PLANO DE CUIDADOS SEGUNDO A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM.

Emanoel Márcio da Silva Rodrigues, Maria Santos Rodrigues[48]
Karla Thamysa Cruz[49]

INTRODUÇÃO: A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é uma das complicações de maior relevância no período gestacional. Ela é classificada em pré-eclâmpsia (forma não convulsiva) e eclâmpsia (episódios convulsivos) e caracteriza-se por um quadro clínico de hipertensão acompanhado de proteinúria e edema (REZENDE; MONTENEGRO, 2011). **OBJETIVO:** Identificar um plano de cuidados com base na SAE e diagnóstico de enfermagem em puérpera com diagnóstico médico de DHEG. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso realizado com uma paciente em atendimento em um hospital maternidade da rede municipal de Fortaleza-CE. A coleta de dados ocorreu no mês de março de 2015, durante o estágio supervisionado de enfermagem no referido hospital. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Puérpera, 33 anos, casada, natural de Pindoretama. É hipertensa e contém histórico de hipertensão na família. Após avaliação propomos os seguintes diagnósticos de enfermagem: Volume de líquidos excessivos, relacionado com ingestão excessiva de sódio, caracterizado por edema e alteração na pressão arterial. Intervenção: avaliar a localização e extensão do edema. Resultado: Controle da preocupação com o peso; controle dos sinais vitais e seleção de alimentos nutritivos; Padrão de sono prejudicado, relacionado à responsabilidade de cuidado, caracterizado por relatos verbais de que não se sente bem descansando. Intervenção: explicar as razões da exigência do repouso no leito. Resultado: estado de conforto e qualidade de vida. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a assistência de enfermagem e realização de educação em saúde é um fator importante no processo de melhoramento, manutenção da saúde e qualidade de vida às pacientes com diagnóstico de DHEG.

Palavras-chave: Pré-Eclâmpsia, Eclampsia e Cuidados de Enfermagem.

[48] Acadêmico do Curso de Enfermagem
[49] Supervisora do Curso de Enfermagem

CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA ANATÔMICA SOBRE INTERCORRÊNCIAS GESTACIONAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Ana Vieira de Sousa, Lívia Costa Sobrinho, Liliane Marques[50]
Denise Fernandes, Juliana Figueiredo[51]

INTRODUÇÃO: O descolamento prematuro de placenta (DPP) é definido como a separação da placenta da parede uterina antes do parto. Essa separação pode ser parcial ou total e classificada em três graus, levando em conta achados clínicos e laboratoriais. Uma das síndromes hemorrágicas mais comuns da segunda metade da gestação que necessita de intervenção rápida e diagnóstica precoce. **OBJETIVO:** Relatar uma experiência prática evidenciada pela construção de uma peça anatômica relativa ao tema. **METODOLOGIA:** A peça anatômica foi construída para mostrar de forma prática a patologia do Descolamento Prematuro de Placenta. Por meio da representação do útero e placenta descolada, utilizando-se de materiais como isopor, EVA e massa de modelar. **RESULTADO:** Foi repassado ao público alvo a relevância que é o DPP na saúde gestacional da mulher e do feto deixando clara toda a sua fisiopatologia com suas complicações, evidenciando seu diagnóstico e tratamento e esclarecendo assim eventuais dúvidas sobre essa patologia. **CONCLUSÃO:** Momento importantíssimo de construção de conhecimento para nós discentes, onde pudemos nos aprofundar sobre esta síndrome hemorrágica tão importante. Também vivenciamos de forma prática a construção da peça anatômica, fortalecendo assim nosso nível de conhecimento sobre o assunto. Posteriormente, seremos capazes de prestar um cuidado holístico à paciente, respeitando sua integralidade e sua individualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Descolamento Prematuro de Placenta; Assistência de Enfermagem;

[50] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[51] Docente do Curso de Enfermagem

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE PLACENTA PRÉVIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Kely Gadelha, Manoel Gadelha Lopes,
Paulo Sérgio Bispo, Romualdo Clemente da Costa[52]
Denise Fernandes[53]

INTRODUÇÃO: A placenta prévia consiste na implantação placentária no segmento uterino inferior, cobrindo, completa ou parcialmente, o orifício cervical. Sua classificação é feita de acordo com sua proximidade com o colo uterino em placenta prévia: parcial (recobre parcialmente o orifício interno cervical), marginal (margeia o orifício interno cervical), total (recobre o orifício interno cervical completamente). Essa intercorrência é caracterizada por sangramentos recorrente, intermitente e de coloração vermelho rutilante com ausência de dor. **OBJETIVO:** Relatar a experiência de produzir uma peça sobre placenta prévia com ênfase no assunto pesquisado. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, com base na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça. **RESULTADOS:** A peça anatômica composta por uma estrutura que representa a cavidade uterina gravídica, bem como, as alterações relacionadas com a placenta em relação com o colo do útero, trouxe a compreensão do assunto abordado. **CONCLUSÃO:** O uso da peça anatômica possibilita a visualização das alterações que acontecem no período gestacional, facilitando o entendimento de como se dá a implantação heterotópica da placenta e os tipos de placenta prévia.

PALAVRAS-CHAVE: placenta prévia – sangramento – colo uterino

[52] Acadêmicas do Curso de Enfermagem
[53] Docente do Curso de Enfermagem

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE A PRÉ-ECLÂMPSIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Brenna de Souza de Oliveira, Ana Dayse Vitória de Oliveira Lopes, José Ednilson Silva, Camila Holanda Sampaio de Moraes[54]
Denise Fernandes, Juliana Figueiredo[55]

INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpsia (PE) é mais do que a hipertensão e se caracteriza como uma síndrome com alterações de múltiplos sistemas e órgãos que leva a graves repercussões materno-fetais. Pouco se conhece a respeito da sua etiologia atualmente, mas sabemos que fatores de risco como a obesidade, histórico familiar positivo para PA, gravidez gemelar e mulheres nulíparas, aumentam a chance de desenvolver esta síndrome. O diagnóstico precoce e o manejo adequado dos casos, pode evitar a ocorrência da grande maioria das mortes maternas. **OBJETIVO:** Descrever a experiência da elaboração de uma peça anatômica que retratasse a fisiopatologia da pré-eclâmpsia e que subsidiasse a nós, discentes, na sistematização e troca dos conhecimentos. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no período de março a abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre a Pré-Eclâmpsia. **RESULTADOS:** Abordamos em nossa peça a deficiência da invasão trofoblástica das artérias uterinas, presente nas gestantes acometidas pela PA. Construímos então, duas réplicas destas artérias: uma em processo fisiológico e a outra em processo patológico, utilizando como material massa biscuit, tintas e uma tela de suporte. **CONCLUSÃO:** Foi evidenciado que essa estratégia de ensino-aprendizagem, a partir da utilização de peças anatômicas, permitiu aos alunos espectadores uma percepção real e didática da estrutura materna acometida e maior compreensão sobre esta síndrome e suas vertentes.

Palavras Chave: Pré-eclampsia, Fisiopatologia, Anatomia, Gravidez.

[54] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[55] Docentes do Curso de Enfermagem

CARACTERÍSTICAS DAS OCORRÊNCIAS PEDIÁTRICAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO CEARA

Waldecya Martins[56]
Yandara Alice Ximenes Bueno[57]

INTRODUÇÃO: O atendimento pré-hospitalar e assistência a qualquer indivíduo de natureza clinica, traumática, psiquiátrica, pediátrica e de gineco-obstétrica que possa levar ao sofrimento, seqüelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar atendimento ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde. Nos casos de urgência e emergência, o atendimento às vitimas deve ser realizado de forma rápida, eficaz e objetiva, que necessitam de uma intervenção para aumento da sobrevida e redução de sequelas. **OBJETIVO:** Geral: Caracterizar as ocorrências pediátricas atendidas pelo Serviço de atendimento móvel de urgência. Específicos: Verificar por meio do boletim de atendimento do Serviço de atendimento móvel de urgência as características de pacientes pediátricos atendidos no período de 2010 a janeiro de 2015, no que se refere ao sexo, faixa etária, procedência, destino, entre outras variáveis. **METODOLOGIA:** O trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa descritiva, Qualitativa, Quantitativa, com uma amostragem de 2010 a 2015. Os dados serão coletados na base operacional do SAMU, localizado no município Eusébio, que serão analisadas e traçado um perfil dessa população.

Palavras chave: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Ocorrências pediátricas, Crianças.

[56] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[57] Docente do Curso de Enfermagem

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE OBESO MÓRBIDO SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM E ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS.

Maria BrunildaMavignier Benevides[58]
Annunziata Cunto de Vasconcelos[59]

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Pelos riscos associados, vem sendo considerada um grande problema de saúde pública nos países desenvolvidos. Estima-se que de 2% a 8% dos gastos em tratamentos de saúde em vários países do mundo sejam destinados à obesidade. **OBJETIVO GERAL:** Relatar os cuidados de enfermagem e aspectos nutricionais no pós-operatório de pacientes obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem quantitativa. O estudo se desenvolverá na cidade de Fortaleza-CE, região nordeste do Brasil, mais precisamente em uma clínica de tratamento para obesidade, no período estimado de junho a agosto de 2015. **RESULTADOS:** Acreditamos que poderemos não só atingir o público-alvo, mas também os profissionais de enfermagem, instigando-os a aperfeiçoarem a sua assistência, a fim de obter melhores resultados no tratamento da obesidade. Confiamos que esse estudo aprimore a compreensão das atividades de autocuidado de pacientes com obesidade em consonância com outras pesquisas já publicadas nesse contexto. **CONCLUSÃO:** Esperamos que através deste estudo possamos ajudar efetivamente à equipe de enfermagem na assistência aos pacientes de obesidade mórbida submetido à cirurgia bariátrica, indo de encontro a melhores resultados no pós-operatório e maiores índices na mudança da qualidade de vida, beneficiando e enriquecendo a atuação do enfermeiro ao portador de obesidade mórbida, contribuindo com indicações de intervenções de enfermagem e percepção de fatores que influenciam a nutrição destes pacientes, dando assim, uma nova visibilidade a assistência oferecida.

PALAVRAS CHAVE: Obesidade. Bariátrica. Enfermagem.

[58] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[59] Docente do Curso de Enfermagem

AS BARREIRAS À PRÁTICA DE ENFERMAGEM BASEADAS EM EVIDÊNCIAS: UM ESTUDO DESCRITIVO

Andréa de Oliveira Nobre Santiago[60]
Denise de Fátima Fernandes Cunha[61]

INTRODUÇÃO: A Enfermagem Baseada em Evidências define-se como investigações necessárias para o desenvolvimento de práticas com o uso em evidências científicas qualificando e atendendo os exercícios diários relacionados na tomada de decisões aos pacientes, preservando os seus critérios, suas características particulares. **OBJETIVOS:** Identificar as principais barreiras individuais e institucionais para o uso da pesquisa como evidência na prática dos enfermeiros da atenção básica. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo com abordagem quantitativa, por formulário coletando dados de enfermeiros assistenciais nas unidades básicas de saúde das respectivas Secretárias Executivas Regionais da cidade de Fortaleza. **RESULTADOS ESPERADOS**: Alcançar e distinguir as barreiras existentes para a Prática Baseada em Evidências e despertar o interesse dos enfermeiros da Atenção Primária de Fortaleza a utilizá-la para melhorar a assistência aprimorando o cuidado exclusivo com o paciente. **CONCLUSÃO:** A saúde engloba uma série de fatores para cuidados na assistência exclusiva ao paciente. Para obter o diferencial é necessário dominar e ter destreza nas atividades diárias, então à utilização de métodos científicos providencia a restauração de ideias e abrange competências pessoais, melhorando a qualidade em seu atendimento.

PALAVRAS CHAVES: Prática Baseada em Evidências. Enfermagem. Atenção Básica em Saúde. Pesquisa.

[60] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[61] Docente do Curso de Enfermagem

ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE FORTALEZA EM RELAÇÃO AO TRAUMA EM IDOSO

Ana Paula Silveira Mariano[62]
Daniel Bruno Resende Chaves[63]

INTRODUÇÃO: O atendimento pré-hospitalar tem fundamental importância no prognóstico de pacientes acometidos por traumas, pois inicia o tratamento mesmo antes do paciente chegar ao hospital e possibilita que este possa ser atendido na unidade hospitalar de modo mais estável. O paciente idoso devido às alterações da própria idade possui um decréscimo da capacidade de resposta ao trauma e deve possuir protocolos de atendimento específicos para esta população. **OBJETIVO:** Analisar os indicadores de qualidade do serviço pré-hospitalar no atendimento ao trauma no idoso. **METODOLOGIA:** Estudo do tipo exploratório, descritivo, documental de natureza quantitativa. A ser realizada no período de julho a agosto de 2015. População: pacientes acima de 65 anos que sofreram algum trauma e foi solicitado atendimento pré-hospitalar. Buscar-se-á informações no setor de arquivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na ficha de ocorrência e nos registros eletrônicos. A coleta de dados será realizada somente após aprovação em comitê de ética em pesquisa e anuência da instituição. **RESULTADOS ESPERADOS:** espera-se estabelecer o quadro do trauma no idoso no município de Fortaleza, comparando os indicadores de eficiência de um serviço pré-hospitalar e as condições clinicas do paciente. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** devido as alterações próprias da idade o paciente idoso possui uma resposta ao trauma mais lenta e, por vezes com pior prognóstico do que o paciente adulto. O serviço de pré-hospitalar deve estar sensível a estas alterações para que possa individualizar suas ações e, consequentemente, obter melhores resultados.

PALAVRAS-CHAVE: PRÉ-HOSPITALAR; IDOSO;TRAUMA; ENFERMAGEM.

[62] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[63] Docente do Curso de Enfermagem

PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL FRENTE AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM OCORRÊNCIA PEDIÁTRICA

YsadoraNágela Moreira Sousa[64]
Yandara Alice Ximenes Bueno de Carvalho[65]

INTRODUÇÃO: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tem como finalidade principal proteger a vida da população, através do socorro rápido e eficiente em situações de urgência e emergência adulta e pediátrica. Diante deste cotidiano surgiu-nos uma equitação, conhecer a forma como estes profissionais enfrentam esta realidade em relação aos seus sentimentos e percepções. **OBJETIVO:** Descrever as percepções e sentimentos da equipe de enfermagem e seus desafios vivenciados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU diante de uma ocorrência pediátrica, por meio de pesquisa com os profissionais. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com caráter descritivo-exploratório a ser realizada na base operacional do SAMU-CE. Situado no município Eusébio, no estado do Ceará. Será realizada uma entrevista com profissionais de enfermagem que atuem no serviço há pelo menos seis meses e já tenham vivenciado um atendimento pediátrico a partir do olhar daqueles que o realizam. A análise dos resultados será contemplada com base no referencial teórico de Barden.

PALAVRAS-CHAVE: Primeiros socorros. Enfermagem. Criança.

[64] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[65] Docente do Curso de Enfermagem

PARASITOSES INTESTINAIS: A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE INFESTAÇÃO POR *ASCARIS LUMBRICOIDE*

Ana Priscila Sousa de Oliveira, Anna Shayara Montenegro dos Santos, Antônia Luana Vieira Rodrigues, Diná de Araújo Carvalho, Elvis Fernandes da Silva, Maria José Lima de Sousa, Raimunda de Paula Fonseca Moreira, Maria Solanger Santos Oliveira[66]

Rosilaine Gomes dos Santos Paixão[67]

INTRODUÇÃO: As parasitoses intestinais são doenças cujos agentes etiológicos são helmintos ou protozoários. Em pelo menos uma das fases do ciclo evolutivo, localizam-se no aparelho digestivo humano e comprometem de forma heterogênea cerca de 30% da população mundial, a maior parte crianças. Não menos relevantes são os agravos à saúde, relacionados a infecções causadas frequentemente por múltiplos parasitas simultaneamente que, por vezes, está associado à desnutrição grave e estado de extrema carência. **OBJETIVO:** Contribuir para o conhecimento dos aspectos epidemiológicos, etiológicos, formas de prevenção e tratamento das infestações por *Ascaris Lumbricoide* em seres humanos. **METODOLOGIA:** Revisão bibliográfica de artigos publicados na base de dados BIREME e SCIELO, a partir das palavras- chaves: Parasitoses intestinais, helmintos e *Ascaris Lumbricoide*. Foram consultados vinte e sete trabalhos sendo que a maioria abordava aspectos da educação em saúde e cuidados específicos na prevenção e tratamento das infestações por parasitoses. **RESULTADOS:** As ações educativas em saúde representam uma boa estratégia de aprendizado. A utilização de banner e folders informativos de fácil assimilação contribui para facilitar a construção do conhecimento coletivo. **CONCLUSÃO:** É necessário formar um novo pensamento sobre a importância da proteção contra doenças. As ações educativas em saúde não são apenas raciocínio clínico, diagnóstico e prescrição médica. Saúde não é apenas intervenção na doença, mas processos de intervenção onde o indivíduo possa dispor de meios para manutenção e recuperação da saúde incluindo fatores orgânicos, socioeconômicos, psicológicos e espirituais.

PALAVRAS- CHAVES: Helmintos, Parasitoses, Educação em Saúde, *Ascaris Lumbricoide.*

[66] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[67] Docente do Curso de Enfermagem

O PERIGO QUE AS BACTÉRIAS OFERECEM QUANDO NÃO SE CONHECE SUA EXISTÊNCIA

MENEZES, Ana Carla; SILVA Daniel Castro;
LIMA, Josivane da Silva; OLIVEIRA, Rafaela Carolino;
GADELHA, Rafael de Sousa; FERREIRA, Soraia Martins;
PAIVA, Viviane Moreira[68]
Rosi Paixão e Musse Jereissati[69]

INTRODUÇÃO: As bactérias são microrganismos constituídos por apenas uma célula (unicelulares), procariontes que são células mais simples, pois não têm núcleo e nem compartimentos membranosos no citoplasma. Em meio a tantas bactérias existentes podemos mostrar uma pouco conhecida e bastante maléfica a saúde da população a *Salmonella*. **OBJETIVO:** Mostrar à população os benefícios e malefícios da bactéria existente na alimentação. **METODOLOGIA:** Para a exportação deste projeto foram utilizados materiais de estudos por meio de artigos científicos via internet, elaboração de banner e folders. **RESULTADOS:** Diante desta análise, a deficiência da qualidade sanitária em qualquer etapa da manipulação e preparação dos alimentos é um fator predisponente à ocorrência de casos, causados pela bactéria *Salmonella*. **CONCLUSÃO:** O presente trabalho possibilitou constatar que a higiene dos alimentos consiste, portanto, na adoção de medidas preventivas e de controle da *Salmonella*; proporcionando assim condições mais seguras do ponto de vista microbiológico no consumo de alimentos. Assim como as medidas de higiene, a vigilância sanitária é de fundamental importância para o combate a surtos de infecção alimentar.

PALAVRAS CHAVES: Bactéria, *Salmonella*, Alimento

[68] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[69] Docente do Curso de Enfermagem

MÉTODO CONTRACEPTIVO DE LACTAÇÃO COM AMENORRÉIA: PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS NUTRIZES.

Fernanda Vieira Pereira [70]
Juliana Viera Figueiredo [71]

INTRODUÇÃO: A oferta de orientações às puérperas sobre os métodos contraceptivos disponíveis para o período puerperal, caracteriza-se como uma importante ação no planejamento familiar. Neste contexto, o enfermeiro tem papel essencial na educação acerca do método-anticoncepcional (MAC) a ser seguido por esta população. Dentre os métodos contraceptivos, destaca-se no puerpério a lactação com amenorréia (LAM), como método seguro e natural, no qual é preconizado que a mulher permaneça em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês pós-parto, em livre demanda e em amenorréia. **OBJETIVO:** Identificar e descrever a percepção de puérperas nutrizes acerca da lactação com amenorréia como método contraceptivo no puerpério. **METODOLOGIA:** Trata-se de estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que será realizado em Unidade Básica de Saúde do município de Pindoretama. Participarão mulheres maiores de 18 anos, entre 30 e 160 dias após o parto, em aleitamento materno exclusivo. Serão realizadas entrevistas a partir de roteiro semiestruturado, em local privativo da unidade de saúde, de acordo com a disponibilidade das participantes. Os dados serão analisados por análise temática de Bardin. Esta pesquisa atenderá aos preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme resolução 466 de 2012. **RESULTADOS ESPERADOS:** A partir da identificação da percepção de puérperas nutrizes acerca da lactação com amenorréia como método contraceptivo no puerpério, será possível a melhoria do cuidado de enfermagem à mulher no puerpério.

Palavras-chaves: Planejamento Familiar; Lactação; Amenorréia**;** Cuidados de Enfermagem.

[70] Acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE
[71] Docente do Curso de Enfermagem

CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES IDOSOS INTERNADOS COM PNEUMONIA ASPIRATIVA

Andreia Lara Almeida Silva[72]
Daniel Bruno Resende Chaves[73]

INTRODUÇÃO: A Pneumonia Aspirativa e um processo infeccioso que causa danos pulmonares, onde a aspiração e definida como uma inalação não apropriada do conteúdo gástrico ou da orofaringe. Destaca-se por ser uma das doenças com maiores índices de notificação. No âmbito hospitalar a bronco-aspiração é vista como um evento sentinela. **OBJETIVO:** Analisar as intervenções de enfermagem implementadas em pacientes com o diagnóstico de enfermagem risco de aspiração. **METODOLOGIA:** Estudo observacional, transversal e de natureza quantitativa. Será realizado em um hospital terciária especializado no atendimento aos pacientes com patologias cardiopulmonares. A população será composta por pacientes com perfil de terapia intensiva. Quanto aos critérios de inclusão temos: pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou com indicação médica de internamento em UTI. Os dados serão coletados mediante instrumento estruturado, este conterá dados sócio-demográficos, diagnósticos médico do paciente, condições gerais, presença de dispositivos avançados para assistência à saúde e informações relativas às características definidoras do diagnóstico de enfermagem "Risco de aspiração". A coleta se dará a aprovação de comitê de ética em pesquisa e consentimento de instituição. **RESULTADOS ESPERADOS:** Estudo ainda não foi realizado. **Considerações finais:** Os cuidados relativos à prevenção de um evento de bronco-aspiração podem impactar consideravelmente no tempo de internação hospitalar, surgimento ou agravamento de pneumonia e, até mesmo, contribuir para o agravamento o estado do de saúde do paciente. Portanto, medidas de prevenção deste evento são clinicamente relevantes e devem compor, obrigatoriamente, o escopo de intervenções de enfermagem caso o paciente apresente fatores de risco.

Palavras Chave: Aspiração respiratória; Pneumonia Aspirativa; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem.

[72] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[73] Docente do Curso de Enfermagem

IMPACTO PSICOLÓGICO DO PACIENTE COM HANSENIASE

Claudia Maria Lima Silva[74]
Georgiana Portela[75]

INTRODUÇÃO: Hanseníase é uma enfermidade milenar que traz consigo a marca do preconceito, discriminação e exclusão social desde o seu surgimento, é uma doença infecto-contagiosa. Durante um longo tempo os indivíduos foram rejeitados pela sociedade, família e amigos e condenados a viver em total situação de privação perdendo o contato com o mundo externo. **OBJETIVO**: através da pesquisa que será realizada, o esperado é mostrar aspectos da doença, desde o diagnostico até a "cura", ou seja, o antes, o agora e o depois do tratamento, orientando o auto cuidado, esclarecendo aos familiares sobre como o medo, preconceito, sentimento e exclusão poderão ser superados resgatando sua auto estima. **METODOLOGIA**: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada no centro de apoio a paciente portador de hanseníase localizado no município de Cascavel, Ceará**. RESULTADOS**: A tarefa da pesquisa consistiu em abordar a hanseníase como doença do cotidiano e o estigma milenar, seguido pelo preconceito e descriminação, centrando sua atividade no conhecimento e informação, trabalhando-se os respectivos sentimentos e dúvidas que serão vivenciados nos encontros. **CONCLUSÃO**: pretende-se concluir que o diagnóstico da hanseníase algumas vezes poderá causar impactos psicológicos, porque se torna um obstáculo, tanto físico como social ou mesmo pessoal, podendo deixar profundas cicatrizes no ser humano.

PALAVRAS-CHAVES; **hanseníase; diagnóstico; Estigma social.**

HPV: O QUE PRECISAMOS SABER?

[74] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[75] Docente do Curso de Enfermagem

OLIVEIRA, Bruna R. de; NOBREGA, Fagundes P.; FREITAS, Graceline V.; GRANJA, Lusia J. C.; SILVA, Maria A. M. da.; GUIMARAES, Maria A. da S.; SILVA, Maria G. da S.[76]
PAIXÃO, Rosilaine G. dos S.[77]

INTRODUÇÃO: O Papilomavírus Humano (HPV) é o nome dado a um grupo de vírus que incluem mais de 100 subtipos capazes de provocar lesões na pele ou mucosa, os tipos 16 e 18 são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de câncer de colo de útero. O HPV é uma das doenças sexualmente transmissíveis (DST) mais comum na atualidade, pode também ser transmitido de mãe para filho durante o parto. O exame preventivo (papanicolau) na idade adulta (entre 25 e 64 anos) e a vacinação contra HPV em adolescentes entre 09 e 13 anos, é a forma mais eficaz na prevenção contra o câncer de colo de útero. **OBJETIVO:** Descrever a doença, forma de transmissão e evolução na prevenção. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo onde a coleta de dados foi realizada através de pesquisa em livros técnicos e levantamento de artigos científicos indexados nas bases de dados: SCIELO, LILACS e BIREME. **RESULTADO:** a vacina contra o HPV é uma importante ferramenta no controle do câncer do colo útero. Sua implantação no Sistema Único de Saúde (SUS) beneficiará milhões de mulheres. O que representa um avanço na proteção, principalmente nas mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual **CONCLUSÃO:** No presente estudo, conclui-se que o cuidado de enfermagem deve ser amplo na educação em saúde, uma vez que a prevenção é a medida mais eficiente para a redução da alarmante prevalência de câncer de colo de útero.

PALAVRAS CHAVE: Papilomavírus Humano; Vacina; Câncer de colo de útero.

[76] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[77] Docente do Curso de Enfermagem

FONTES DE CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA – CE: UM ESTUDO DESCRITIVO À LUZ DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA.

Najla Lima Rodrigues[78]
Denise de Fátima Cunha Fernandes[79]

INTRODUÇÃO: A prática baseada em evidências é uma abordagem que envolve a definição de um problema, a busca e avaliação crítica das evidências disponíveis, implementação das evidências na prática e avaliação dos resultados obtidos. **OBJETIVO:** Avaliar as principais fontes de conhecimento dos enfermeiros da atenção básica de Fortaleza. **METODOLOGIA:**Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo com abordagem quantitativa. O trabalho será desenvolvido em instituições da atenção básica de Fortaleza, com enfoque nas UBS da Regional V. no período de Agosto á Outubro de 2015. A população do estudo será composta pelos enfermeiros que atuam nas UBS dessa regional. **RESULTADOS ESPERADOS:** Identificar a utilização da prática baseada em evidências desse grupo de enfermeiros.Conseguir analisar com que frequência essas fontes de informação são utilizadas. **CONCLUSÃO:** Nesse sentido, entendemos que a prática baseada em evidências é uma maneira de incentivar os profissionais enfermeiros a buscar o conhecimento cientifico por meio do desenvolvimento de pesquisas atuais e a aplicação da sua prática profissional nos resultados encontrados na literatura. Entretanto cabe ao profissional dispor de tempo para desenvolver habilidades como obter, interpretar e integrar as evidências oriundas da pesquisa.

PALAVRAS CHAVES: Prática Baseada em Evidências. Conhecimento. Enfermagem.

[78] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[79] Docente do Curso de Enfermagem

ESTUDO DE CASO PACIENTE COM LITÍASE BILIAR

Jéssica RodriguesCosta, Josilene Uchôa Andrade
Raphaela Veridiana Silva[80]
Profª. Ms. Cleide Gomes Bezerra[81]

INTRODUÇÃO: A litíase biliar é definida pelo surgimento de cálculos biliares na cavidade da vesícula biliar. Os cálculos biliares são formados por colesterol ou calcificação da bilirrubina, quando a mesma está em grandes quantidades na bile. **OBJETIVO**: Desenvolver um estudo de caso com paciente idoso portador de colelitíase e HAS previa, focando na Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE). **METODOLOGIA**: Narrar um estudo de caso abordando a SAE, por meio de coleta de dados, exame físico e pesquisa de prontuário, no período de 17 a 20 de março em um hospital de atendimento secundário no setor de enfermaria para apresentação na disciplina APS. **RESULTADOS:** A. R S, 71 anos, sexo masculino, casado, admitido no dia 10 de março de 2015 com diagnostico de litíase biliar para realização de colecistectomia. Os diagnósticos de enfermagem encontrados por meio da taxonomia NANDA, NIC e NOC foram: ansiedade; dor e desconforto agudo relacionado com a incisão cirúrgica; integridade da pele prejudicada relacionada ao processo invasivo. As intervenções foram: administrar analgésicos de acordo com a prescrição médica; ajudar o paciente a mudança decúbito e a deambular; manter técnica asséptica, monitorar sintomas associados à infecção local e sistêmica; observar as características da drenagem e monitorar o processo de cicatrização. **CONCLUSÃO**: Com assistência de enfermagem ao paciente com litíase biliar reduz o risco de infecção, promove o bem estar, auxilia na recuperação da motilidade e na prevenção e recuperação das lesões da pele, gerando qualidade de vida aos pacientes idosos que estão em pós operatório imediato.

PALAVRAS-CHAVE: Litíase, Sistematização, Enfermagem.

[80] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[81] Docente do Curso de Enfermagem

PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA: CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA – CE

Jéssica Rodrigues Costa[82]
Denise de Fátima Fernandes Cunha[83]

INTRODUÇÃO:A prática baseada em evidências não conta com a intuição, observações não sistematizadas ou princípios patológicos. Ela enfatiza o uso de pesquisas para guiar a tomada de decisão clínica. A Educação Permanente em Saúde (EPS) pode ser estratégia para qualificação do enfermeiro para a clínica ampliada. **OBJETIVO:** Caracterizar o enfermeiro da atenção básica do município de Fortaleza - CE. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo com uma abordagem quantitativa. Nessa abordagem quantitativa, o pesquisador identifica variáveis de interesse, desenvolve definições operacionais dessas variáveis e, depois, coleta dados relevantes dos sujeitos. São usados instrumentos formais para coletar as informações que são reunidas de forma quantitativa, isto é, informação numérica que resulta de mensuração formal e que é analisada com procedimentos estatísticos. **RESULTADOS ESPERADOS:** Obter o perfil sociodemográfico dos enfermeiros da atenção básica do município de Fortaleza–CE. **CONCLUSÃO:** Ao se estudar os fatores sociodemográfico associados ao perfil dos enfermeiros, pode-se formular hipóteses acerca da utilização da PBE por esses profissionais.

[82] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[83] Docente do Curso de Enfermagem

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE INFORMAÇÃO PELOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA- CE: UM ESTUDO DESCRITIVO ATRAVÉS DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS.

Mikaela Sousa Balica Da Silva[84]
Denise de Fatima Fernandes Cunha[85]

INTRODUÇÃO: A EBE é definida como aplicação de informações válidas, relevantes, com base em pesquisas, na tomada de decisão do enfermeiro. Os achados de pesquisa, sozinhos, não ditam o comportamento clínico. Ao contrário, são usadas junto com o conhecimento que se tem dos pacientes, como sintomas, diagnósticos e preferências manifestada, e o contexto em que a decisão está ocorrendo, incluindo o ambiente do cuidado e os recursos disponíveis. **OBJETIVO**: Verificar a frequência com que o enfermeiro utiliza os recursos de informações, seja no local de trabalho ou em casa, para se basear em tomadas de decisões no campo profissional. **METODOLOGIA**: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. Será aplicado um questionário, para verificar a frequência dos enfermeiros na atenção básica das SER de Fortaleza, e analisar a utilização dos recursos de informações e a disponibilidade dos acessos de informações. **RESULTADOS**: Espera-se determinar a frequência do uso e acesso às informações, para melhorar a qualidade do atendimento na atenção básica. **CONCLUSÃO**: Conclui-se que a PBE tem sido considerado o principal paradigma de mudanças no sistema de formação educacional e na prática da área de saúde. Porém no ambiente da PBE, um clínico habilidoso não pode mais confiar em informações memorizadas; em vez disso, precisa acessar, validar e sintetizar conhecimentos, usando os novos dados das pesquisas científicas.

PALAVRAS-CHAVE: Prática Baseada em Evidências, Enfermagem, Informações.

[84] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[85] Docente do Curso de Enfermagem

TRICOMONÍASE: A DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL NÃO VIRAL MAIS COMUM NO MUNDO

Ana Caroline cruz da Silva, Elizangêla da Silva Moura, Ingrid Brenda de Sousa Abreu, Francisca Jacinta Da Silva Teixeira, Lucas Nascimento de Oliveira, Wilker de Andrade Pinheiro[86]
Rosilaine Gomes Santos Paixão[87]

INTRODUÇÃO: Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) é assunto discutido por muitos atualmente. Dentre essas doenças existe a Tricomoníase, doença sexualmente transmissível não viral mais comum no mundo. É causada pelo protozoário *Trichomonas vaginalis,* ocasionando manifestações clínicas assintomáticas até severa vaginite. **OBJETIVO:** Expor conhecimentos de forma geral a respeito da doença Tricomoníase**. METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde foram estudados artigos relacionados ao tema geral protozoário. Observaram-se as principais doenças causadas por este microrganismo, a doença Tricomoníase foi escolhida como foco do estudo. **RESULTADOS:** Destacado como um dos principais patógenos do homem e da mulher, a Tricomoníase está associada a sérias complicações de saúde. Os principais sintomas são: edema vaginal, prurido (coceira) vaginal, manchas avermelhadas na vulva, odor forte e desagradável, dificuldade de urinar. Relaciona-se também a baixo peso de bebês, bem como nascimentos prematuros. Homens com Tricomoníase podem apresentar irritação na parte interna do pênis, leve corrimento uretral, dor ao urinar ou ejacular. As medidas de prevenção da Tricomoníase incluem as mesmas medidas profiláticas de outras DSTs, como prática de sexo seguro e uso de preservativos. **CONCLUSÃO:** A prevalência mundial anual da Tricomoníase é de 180 milhões de casos, 92% destes ocorrem em mulheres. Assim como outras DSTs a Tricomoníase tem formas de prevenção simples.

PALAVRAS-CHAVES: Doença; prevenção; complicações;

[86] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[87] Docente do Curso de Enfermagem

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PACIENTE COM FATORES DE RISCO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E MAMA: ESTUDO DE CASO BASEADO NO REFERENCIAL TEÓRICO DE HILDEGARD ELIZABETH PEPLAU

Madna Avelino da Silva, Rafaella Dandara Nunes de Oliveira[88]
Francisca Juliana Grangeiro Martins[89]

INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) define a organização do cuidado ao paciente, sendo responsabilidade privativa do enfermeiro e de extrema importância na organização do serviço, tem como base estrutural o início do plano do cuidado e formar um plano estratégico para cuidar do indivíduo da melhor forma, possui cinco etapas: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento, Implementação e Avaliação. **OBJETIVO:** Desenvolver a sistematização da assistência de enfermagem a uma paciente com fatores de risco para desenvolver câncer de colo do útero e mama, segundo a Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Elizabeth Peplau. **METODOLOGIA:** O presente estudo de caso realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente à regional V do município de Fortaleza/CE, no decorrer da disciplina Atividade Prática Supervisionada - APS em três momentos com duração em média de 30 minutos cada, foi aplicado o processo de enfermagem fundamentado na Teoria de Peplau, devidamente autorizado pela paciente através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Destacamos os principais diagnósticos, que diz respeito ao seu conhecimento deficiente e buscamos atingir o controle da propagação do HPV e contrair outras DSTs. Enquanto principais metas, as DSTs. Assim, as pesquisadoras, enquanto acadêmicas de enfermagem, assumiram o papel de professoras tendo em vista a relevância da enfermagem como um instrumento educativo. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**Podemos perceber a importância do enfermeiro na atenção básica, realizando promoção e educação em saúde, tendo como objetivo a redução da incidência dos casos de DSTs e controle da contaminação dos parceiros.

PALAVRAS CHAVES: Enfermagem; Promoção; Prevenção; Teoria De Enfermagem; Processo De Enfermagem.

[88] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[89] Docente do Curso de Enfermagem

RELATO DE EXPERIÊNCIA E CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBREODESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA

Alef Moreira Lima, Marcia Maria Araripe Silva, Mariana Luiza Sales Rodrigues Abreu, Rafael Sanders Viana[1], Valdey Fernandes Pereira[90]
Denise de Fátima Fernandes Cunha[91]

INTRODUÇÃO: O descolamento prematuro de placenta (DPP) é quando acontece a separação antecipada de parte ou da totalidade da placenta da parte do útero, afetando sua ligação com o útero antes do bebê nascer. Quando isso ocorre, o suprimento de oxigênio e nutrientes para o bebê fica comprometido e pode ocorrer um sangramento grave, perigoso tanto para o bebê como para a mãe. **OBJETIVO:** Relatar experiência da construção de uma peça anatômica sobre a DPP. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre DPP.**RESULTADOS**:A peça anatômica é composta por materiais reutilizáveis, como papelão, e outros como tinta guache, isopor, cola, boneco, algodão. As estruturas confeccionadas foram a placenta, o útero, cordão umbilical, desenho do corpo gravídico. **CONCLUSÃO:**A utilização da peça anatômica, possibilita informar de forma lúdica, sobre as alterações causadas pela DPP, possibilitando uma melhor compreensão dos acadêmicos sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVES: Descolamento prematuro de placenta, DPP, Intercorrência gestacional.

[90] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[91] Docente do Curso de Enfermagem

QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS HOSPITALIZADOS PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA

Adriely Cabral Castelo[92],
Daniel Bruno Resende Chaves[93]

INTRODUÇÃO: Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é a incapacidade do coração em manter sua função de bomba volêmica. Está associada a readmissões hospitalares, baixa qualidade de vida, risco de mortalidade precoce e altos custos ao sistema de saúde. Atuando como mediador entre pratica e teoria, o enfermeiro é o líder de uma equipe de saúde centrada no cuidado no âmbito da enfermagem. Diante dessas informações surgiu-nos uma pretensão de saber quais fatores influenciam na variação do quadro clínico do paciente hospitalizado e em que altera em sua qualidade de vida. **OBJETIVO:** Identificar o nível de qualidade de vida dos portadores de insuficiência cardíaca e a influência das limitações impostas pela ICC no cotidiano destes pacientes em pacientes internados. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, observacional de natureza quantitativa. Será realizada em um hospital terciário especializado no atendimento às doenças cardiopulmonares. Critérios de inclusão: estarem devidamente internados com diagnóstico médico de ICC ou alguma complicação desta; ter mais de 18 anos. Critérios de exclusão: serão excluídos os pacientes que não puderem responder aos inquéritos solicitados devido à gravidade do quadro clínico. A coleta de dados se dará após aprovação em comitê de ética em pesquisa e anuência da instituição. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se identificar nesta população específica um panorama do estado de qualidade de vida com enfoque nos possíveis pontos a serem trabalhados pelo enfermeiro. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**: A ICC determina diversas sintomatologias que podem comprometer a qualidade de vida dos pacientes.

PALAVRAS –CHAVE: Qualidade de Vida; Insuficiência Cardíaca; Enfermagem.

[92]Acadêmica do Curso de Enfermagem
[93] Docente do Curso de Enfermagem

PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADA À GESTANTE NA CONSULTA DE PRÉ - NATAL: UM ESTUDO DE CASO EMBASADO NO REFERENCIAL TEÓRICO DE IMOGENE KING.

Ana Karoline Xavier da Silva, Marcielma de Souza Oliveira[94]
Francisca Juliana Grangeiro Martins[95]

INTRODUÇÃO: A assistência pré-natal consiste no conjunto de medidas e protocolos de condutas preventivas, educativas e curativas que tem por objetivo proporcionar à gestante e sua família condições de bem-estar físico, psíquico e social, além de acompanhamento materno-fetal. **OBJETIVO:** Descrever a implementação do processo de enfermagem junto a uma gestante na consulta de pré-natal, desenvolvido à luz das concepções teóricas de Imogene King, com utilização da taxonomia II de diagnósticos de enfermagem NANDA, NIC e NOC. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa tipo estudo de caso descritivo-exploratório. Os dados foram coletados em dois encontros na UBSF, por meio de entrevista semi-estruturada e observação, foi aplicado o processo de enfermagem fundamentado na Teoria do Alcance de Metas de Imogene King. Devidamente autorizado pela paciente através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. **RESULTADOS**: Foi desenvolvido um plano de cuidados pautado na resolução de problemas a partir do alcance de metas, sendo identificados diagnósticos de enfermagem, para os quais as intervenções de enfermagem foram planejadas, implementadas e avaliadas: Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais; Risco de constipação; Ventilação espontânea; Disposição para aumento do autocuidado; Risco de paternidade ou maternidade prejudicada; Risco de infecção; Integridade da pele prejudicada. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A incorporação dos conceitos propostos na Teoria do Alcance de Metas permitiu a compreensão do cuidar em seu sentido amplo, considerando os aspectos biopsicossociais envolvidos para que as metas fossem alcançadas, a partir da melhoria da qualidade de vida da gestante através das orientações repassadas na consulta de enfermagem no acompanhamento do pré-natal.

Palavras chave: Teoria de Enfermagem; Processos de Enfermagem; Pré-Natal; Educação em Saúde.

[94] Acadêmicas do Curso de Enfermagem
[95] Docente do Curso de Enfermagem

PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO AO PACIENTE COM OBESIDADE GRAU II: ESTUDO DE CASO BASEADO NO REFERENCIAL TEÓRICO DE OREM.

Aparecida Alessandra Santiago de Oliveira, Shirlenice Pinheiro Ferrreira[96]
Francisca Juliana Grangeiro Martins[97]

INTRODUÇÃO: O processo de enfermagem ao paciente obeso grau II, conforme a Teoria do Déficit de Autocuidado de Orem deve ser uma das metas a serem alcançadas, para que o paciente seja estimulado a participar de forma ativa na terapêutica, tornando-se responsável pela condução e resultados da assistência. **OBJETIVO:** Descrever a Sistematização da Assistência de Enfermagem a um trabalhador autônomo, com queixa de obesidade, tendo como referencial a teoria do Autocuidado de Orem, utilizando os Diagnósticos de Enfermagem da Taxonomia II da NANDA, Intervenções de Enfermagem da NIC e Resultados de Enfermagem da NOC. **MÉTODOS:** Estudo de caso desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), do município de Fortaleza – CE. Realizado no mês de março, durante estágio supervisionado I. Utilizou-se como instrumento um roteiro de entrevista semi-estruturado. Aplicou-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem. **RESULTADOS**: Histórico, exame físico, diagnósticos, metas, intervenções e resultados esperados. Assistência embasada na Teoria de OREM, que levou aos seguintes diagnósticos: Nutrição desequilibrada mais do que as necessidades corporais relacionado à ingesta excessiva em relação às necessidades metabólicas, definido por comer em resposta a estímulos externos; Estilo de vida sedentário relacionado à conhecimento deficiente sobre os benefícios que a atividade física traz à saúde, caracterizado por falta de condicionamento físico; Autocontrole ineficaz da saúde relacionado ao déficit de conhecimento. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Evidenciou-se a importância da aplicação do processo de enfermagem, pautado na utilização da NANDA, NIC e NOC, a fim de facilitar a identificação de diagnósticos de enfermagem.

Palavras chave: Processo de Enfermagem; Autocuidado; Obesidade.

[96] Acadêmicas do Curso de Enfermagem
[97] Docente do Curso de Enfermagem

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE: HIGIENE PESSOAL PARA IDOSOS

Allan Cruz da Silva, Isa Maria da Silva, Maria Lucilene de Souza, Mickaelly de Moraes Parente, Thiago Gomes, Will Hermison Gomes[98]
Juliana Pereira[99]

INTRODUÇÃO: Este trabalho descreve a realização de uma prática educativa em saúde acerca de bons hábitos de higiene pessoal, direcionada à idosos que residem na instituição Casa Abrigo, pois em geral esse grupo etário necessita de cuidados especiais, que vão desde a atenção com a pele à saúde bucal. **OBJETIVO:** Tem se como objetivo apresentar e ensinar bons hábitos de higiene pessoal, bem como os efeitos salutares desses hábitos, relacionados ao bem estar físico e emocional. Pretende-se também ofertar materiais de higiene visando a efetivação da prática educativa de saúde básica. **METODOLOGIA:** A metodologia escolhida foi o formato de palestra educativa, ou seja, uma apresentação oral informativa/esclarecedora acompanhada da distribuição de folhetos educativos que ilustram as práticas anteriormente apresentadas. **RESULTADOS:** Os resultados obtidos foram interações positivas dos idosos junto as falas dos palestrantes, as dúvidas apresentadas foram esclarecidas e foi observado um comprometimento dos idosos para a vivência dessas práticas em seu dia a dia. Para os idosos a palestra além do caráter educativo teve caráter social, pois eles puderam se relacionar com pessoas que estão além do ambiente no qual estão inseridos, o que os fez sentirem se lembrados. **CONCLUSÃO:** Por meio deste trabalho foi observado que as práticas educativas de bons hábitos de higiene pessoal são de grande relevância, pois tem potencial de promover transformações de comportamento, que por sua vez, auxiliam na melhora da qualidade de vida do indivíduo, que gera autossatisfação e assim resgate da autoestima, e estas práticas se fazem necessárias não somente para idosos, mas também para as demais pessoas.

PALAVRAS CHAVES: PRÁTICAS EDUCATIVAS; HIGIENE PESSOAL; SAÚDE; IDOSOS.

[98] Acadêmicos do Curso de Enfermagem
[99] Docente do Curso de Enfermagem

VIGILÂNCIA EM ACESSO VASCULAR PARA HEMODIÁLISE

Raphaela Veridiana Silva[100]
Emerson Ramalho Ferreira[101]

INTRODUÇÃO: A hemodiálise (HD) é indicada como procedimento para depurar as escórias de pacientes que perderam a função renal. É requerido um acesso venoso como o catéter (CDL) ou a fístula arteriovenosa (FAV) para o procedimento. A manutenção destes acessos é um desafio no cuidado a estes pacientes. **OBJETIVO:** Sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente em uso de CDL e FAV; Gerenciar as intercorrências relacionadas ao uso destes acessos vasculares na hemodiálise. **METODOLOGIA:** Estudo de natureza observacional e descritiva. Em uma clínica será feita a consulta de enfermagem voltada para as intercorrências com o acesso vascular, sendo identificados os diagnósticos de Enfermagem e sugeridas as intervenções. **RESULTADOS ESPERADOS:** Melhorar a prática intervencionista do enfermeiro na HD, fornecendo orientações e sugerindo um processo de vigilância para manutenção destes acessos venosos, detectando anormalidades precocemente. **CONCLUSÃO:** O acesso para hemodiálise é a linha de vida do paciente e o sucesso da sua confecção, do tempo de uso deste acesso e das intervenções realizadas precocemente relacionam-se à sobrevida deste paciente no ambiente hemodialítico.

PALAVRAS-CHAVE: Diálise renal, Fístula arteriovenosa, Cuidados de Enfermagem.

[100] Acadêmica do Curso de Enfermagem
[101] Docente do Curso de Enfermagem

NOVOS TIPOS DE HIPOGLICEMIANTES NO MERCADO

Sérgio Cunha, Sueli Nascimento, Adriana Bezerra, Francisca Nariene, Isaac Santos, Rafaele Silveira, Silvia Nogueira, Sueli Nascimento, Viviane Santos[102]
Emiliano Vasconcelos[103]

Introdução: hipoglicemia é um distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no sangue, que pode afetar pessoas portadoras ou não de diabetes. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que funciona como fonte de energia para a entrada da glicose nas células. Os quadros de hipoglicemia instalam-se quando aumenta a quantidade de insulina no sangue, ou diminui a quantidade dos hormônios de contra regulação. Esses hormônios são produzidos quando se esgota o estoque disponível de glicose no sangue, e ajudam a liberar o glicogênio armazenado no fígado. **Objetivo**: divulgar o tratamento da hipoglicemia que está diretamente associado à causa de distúrbios. Quanto à hipoglicemia reativa, o melhor é prevenir as crises. Por paradoxal que possa parecer, assim como nos casos de diabetes, é fundamental restringir ao máximo a ingestão de açúcares. **Metodologia:** pesquisas bibliográficas e artigos científicos com base de dados scielopubmed. **Resultados**: conscientizar a população em geral sobre a importância do conhecimento sobre os novos tratamentos a fim de tentar reduzir o grande índice de pacientes hiperglicêmicos o tratamento da hiperglicemia está diretamente associado à causa do distúrbio. **Conclusão**: de acordo com a discussão do trabalho desenvolvido, acreditamos ter contribuído com informações a respeito do tratamento de pacientes hiperglicemicos. Além de informar a população novos tratamentos que visam a melhor qualidade de vida.

Palavras chaves: insulina. Hipoglicemia. Glicose. Diabetes. Hiperglicêmicos.

[102] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[103] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

MARCADORES USADOS NO DIAGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA

Lopes,Geanimar; Capelo,Fernanda; Braga, Ineiliane; Aquino, Valdison[104]
Dantas, Mariana[105]

INTRODUCÃO: A Insuficiência renal aguda (IRA) é frequentemente observada em pacientes internados e sua prevalência está aumentando. Ela representa uma condição clínica causada pela diminuição ou perda da capacidade de manutenção dos equilíbrios, ácido-base e hidroeletrolítico. Sabidamente, as manifestações clínicas da IRA são incipientes, silenciosas e se confundem com sinais clínicos de diversas outras morbidades, sendo frequentemente percebidas quando constatadas alterações em exames laboratoriais de rotina, como a ureia e principalmente a creatinina. Surge à busca para identificação de biomarcadores precisos da função renal. **OBJETIVO:** Avaliar a importância do uso dos marcadores no diagnóstico da insuficiência renal aguda. **MÉTODOS:** Foi realizado um estudo descritivo baseado em literaturas e artigos bibliográficos no período de 2007 a 2014, por meio de bases de dados: SCIELO, LILACS. **RESULTADOS:** Além da creatinina, uréia, microalbuminúria e proteínas na urina, hoje o laboratório tem mais duas ferramentas mais sensíveis para a avaliação da função renal: a Cistatina-C e o NGAL.Todos os marcadores anteriores podem sofrer alterações de fatores associados, como idade, massa muscular, dieta, metabolismo proteico, sexo, medicamentos e algumas doenças. A proteinúria, quando ocorre em concentrações anormais é um indicador bastante sensível e confiável de doença renal. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que houve um grande avanço da parte dos pesquisadores a busca de novos biomarcadores, essa conquista resulta em um grande progresso para a medicina oferecendo-lhe um diagnóstico precoce da insuficiência renal, visando um tratamento preciso e adequado para esses pacientes.

PALAVRAS CHAVES: insuficiência renal; função renal; biomarcadores.

[104] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[105] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL POR OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS

Fabiana Lira da Silva[106]
Mariana Brito Dantas[107]

INTRODUÇÃO: Os benefícios da terapia antirretroviral são inquestionáveis, no entanto as reações adversas estão cada vez mais presentes na vida de quem tem que conviver com esquemas potentes e complexos, sendo um dos principais fatores limitantes da adesão a terapia antirretroviral. **OBJETIVO**: Avaliar as trocas de terapia antirretroviral (TARV) ocasionadas por reações adversas em pacientes HIV/AIDS. **METODOLOGIA**: O estudo descritivo, retrospectivo e de base documental foi desenvolvido a partir de dados presentes em Formulários de Solicitação de Medicamentos antirretrovirais, disponíveis no arquivo da farmácia ambulatorial e em prontuários médicos. Todas as análises foram feitas através do programa Microsoft Excel 2007. **RESULTADOS**: Dos 29 pacientes que apresentaram reação adversa a TARV, 51,72% são do sexo feminino e 48,27% são do sexo masculino, com faixa etária de 40 a 49 anos. As principais reações adversas encontradas nos prontuários dos pacientes incluem as toxicidades neuropsiquiátricas (40%), as gastrointestinais (33,3%), as dermatológicas (20%) e as hematológicas (6,6%). **CONCLUSÃO**: A reação adversa foi a principal razão para as modificações de TARV, sendo esta prevalente nos pacientes com o uso do Efavirenz e do LPV'r (lopinavir + ritonavir). Este estudo contribuiu para a melhora do reconhecimento, tratamento e prevenção desse evento, promovendo melhor adesão ao tratamento antirretroviral.

Palavras-chaves: Reação adversa. HIV/AIDS. Terapia antirretroviral.

[106] Acadêmica do curso de Farmácia da FAECE
[107] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

APLICAÇÃO TERAPÊUTICA DOS ANTICORPOS MONOCLONAIS

José Filipe da Silva, José Flávio Lima da Cunha, Maria Heloísa Ayres dos Santos, Francisca Antônia Keilane Pinheiro de Lima, Francisco Roberto Freire, Ivynna Thamyris Nogueira, Francisco Rogério M. Pinheiro[108]
Emiliano Ricardo Vasconcelos Rios[109]

INTRODUÇÃO: Anticorpos são proteínas plasmáticas, altamente específicas, produzidas por células B diferenciadas responsáveis por nossa imunidade. Com base na definição, muitos cientistas desenvolveram uma nova Classe Terapêutica que revolucionou a Oncologia, os Anticorpos Monoclonais (AM). Nesse sentido, os AM são capazes de reconhecer e ligar-se a antígenos tumorais específicos (alvos), desencadeando respostas imunológicas. Desta forma, poupam as células normais e provocam efeitos menos tóxicos que a quimioterapia tradicional humoral. **OBJETIVO:** Esclarecer conceitos e utilidades dos Anticorpos Monoclonais para a Clínica Médica. **METODOLOGIA:** Adotou-se a revisão integrativa realizada em algumas bases de dados conhecidas, como SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde. Utilizaram-se os descritores Anticorpos AND Monoclonais AND Câncer, encontrando-se três artigos. **RESULTADOS:** A seleção de alvos específicos representa a chave para o sucesso da criação de AM usados na terapia do câncer. Nesse viés, esses agentes são efetivos através de vários mecanismos, podendo, por exemplo, **bloquear receptores ou fatores de crescimento essenciais à célula**, **induzir apoptose**, ligar-se a alvos celulares e recrutar funções como **citotoxidade celular anticorpo-dependente (ADCC)**. Dessa forma, os principais AM utilizados na clínica são: **Rituximabe, Bevacizumabe**, **Trastuzumabe**, **Gemtuzumabeozogamicin**, **Alemtuzumabe**, **Ibritumomabetiuxetan**, **I-tositumomabe131** e **cetuximabe**. Apesar de tudo, como qualquer fármaco, os AM possuem efeitos indesejados, como: **febre**, **calafrios**, **broncoespasmo**, dispnéia, diarreia, **hemorragias gástrica,** por isso seu uso exige cuidados e cautela. **CONCLUSÃO**: Assim, devido à ação poderosa dos Anticorpos Monoclonais contra as células cancerígenas, requer-se a participação de profissionais com capacidade e habilidade a fim de garantir a eficácia terapêutica e a segurança do paciente.

Palavras-Chaves: Anticorpos. Monoclonais. Câncer

[108] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[109] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

ÁCIDOS GRAXOS, ÔMEGA 3 E PLAQUETAS NAS DOÊNÇAS CARDÍACAS.

Carlos Edgar da Silva, Clara Durval da R. Abreu, Claudina dos Santos, Edivaldo Paiva, Gabriel Nunes, Henrique Santos, Priscilla Andrade, Vanessa Vieira, Ygor Rodrigues[110]
Alba Fabíola Costa Torres[111]

Introdução: A doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e na maioria dos países desenvolvidos. A incidência dessa doença tem sido associada aos altos níveis de colesterol sanguíneo. A concentração lipídica no plasma está relacionada com a natureza e a quantidade de gorduras no alimento. **Objetivo:** Abordar aspectos relevantes nutricionais empregadas para a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares associadas a distúrbios lipídicos. Ressaltando os efeitos benéficos de utilização de AG ω-3 na dieta, tendo em vista a prevenção de doenças cardiovasculares. **Metodologi a:** Este estudo foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas retiradas de artigos através do Google Acadêmico, na qual foram utilizadas palavras-chave como: "Ômega 3"; "Nutrição"; "Ácidos graxos", "Doenças cardiovasculares"; "Plaquetas". Foram encontrados dez artigos e considerou-se o uso dos mais relacionados ao estudo. **Resultados:** AG tipo ômega-3 vem sendo alvo de diversos estudos, pois reduzem os triglicerídeos séricos, melhoram a função plaquetária e promovem ligeira redução na pressão arterial (PA) em pacientes hipertensos, sendo encontrados principalmente nos óleos de peixes de águas frias e profundas como o salmão, arenque atum e sardinhas. **Conclusão:** Muitos estudos indicam que os AG ω-3 parecem diminuir ou inibir o risco de fatores ligados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, não por concentrações de lipídios sanguíneos variáveis, embora EPA e DHA (tipos de ω-3) diminuam as concentrações de triglicerídeos, mas por reduzirem a coagulação sanguínea e arritmias ventriculares. As intervenções clínicas fornecem suporte adicional para os efeitos benéficos de utilização de AG ω-3 na prevenção de doença cardiovascular.

Palavras-chave: Ômega-3, Ácidos graxos, Doenças cardiovasculares;

[110]Acadêmica do curso de Farmácia da FAECE
[111] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS POR ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Ana Ruth Rocha Almeida[112]
Lana Karine Vasconcelos Barroso[113]

INTRODUÇÃO: A fitoterapia vem ganhando cada vez mais espaço no meio científico por meio da comprovação das propriedades terapêuticas das plantas medicinais e, com isso, a utilização de produtos fitoterápicos pela população tem aumentado significativamente. **OBJETIVO**: Objetivou-se analisar a utilização de plantas medicinais por estudantes do curso de farmácia em uma instituição privada do município de Fortaleza-CE. **METODOLOGIA**: Tratou-se de um estudo descritivo observacional de caráter quantitativo. A pesquisa foi realizada na faculdade de ensino e cultura do Ceará- FAECE, foram analisadas quais plantas são utilizadas e suas respectivas finalidades de uso. A coleta de dados foi por meio de questionário semiestruturado e os sujeitos do estudo foram estudantes do curso de farmácia da faculdade de ensino e cultura do Ceará - FAECE do 1º ao 8º semestre do curso, homens e mulheres acima de 18 anos. **RESULTADOS**: Verificou-se que 77% dos entrevistados fazem o uso de plantas medicinais, enquanto 23% dos entrevistados não fazem o uso de plantas medicinais. Foi possível observar que 71% dos entrevistados do sexo masculino utilizam plantas medicinais, resultado próximo ao do grupo feminino, onde cerca de 80% do grupo fazem o uso de plantas medicinais. Além disso, 85,7% dos entrevistados utilizam plantas medicinais por recomendação de parentes. **CONCLUSÃO**: Conclui-se que o uso de plantas medicinais está muito presente entre os estudantes, não havendo diferenças significativas do uso entre sexo e semestre em curso. Tal achado evidencia que o saber e costumes populares são passados por gerações.

Palavras-chave: Plantas Medicinais, Fitoterapia, Propriedades terapêuticas.

[112] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[113] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

ALTERAÇÃO SOROLÓGIA APÓS USO DE FOTOPROTETOR – RELATO DE CASO.

Drielle Sousa de Azevedo Soeiro[114]
Adelita Duanra Medeiros do Monte Arnaud, Rosilaine Gomes dos Santos Paixão[115]

INTRODUÇÃO: Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune sistêmica caracterizada pela produção de autoanticorpos, formação e deposição de imunocomplexos, inflamação em diversos órgãos e dano tecidual. Sua etiologia multifatorial envolve a radiação ultravioleta (290-320nm). Uma manifestação cutânea do LES, 70 – 80% dos casos é o Lúpus eritematoso cutâneo crônico (LECC) e neste tipo de comprometimento o uso de fotoprotetor (FPS) é parte da terapêutica envolvida na atenuação e ou resolução das lesões cutâneas. **OBJETIVO**: Relatar a melhoria das lesões cutâneas e laboratorialmente do paciente com Lúpus, a redução dos títulos de anticopos Anti-SSA/Ro e Anti-SSB/Ro por ensaio de imunofluorescência indireta com metodologia Hep – 2000. **METODOLOGIA :** Foi aplicado questionário para identificar o uso e o modo de aplicabilidade no paciente; demonstração do uso correto do FPS e esclarecimentos quanto a dúvidas da paciente referente ao fotoprotetor. O soro do paciente foi submetido a pesquisa de anticorpos anti-SSA / Ro que são o tipo mais prevalente de anticorpos antinucleares (ANA) envolvidos no LECC; utilizando o substrato HEp-2000, que consiste de HEp-2 onde células transfectadas com ADNc de Ro60. **RESULTADOS:** A melhora favorável do quadro clínico da paciente, detectado laboratorialmente estiveram em concordância à introdução do protetor solar. **CONCLUSÃO**: Usando FPS tornou possível uma visível melhora nas lesões cutâneas, indicativo da melhora profunda do paciente.

PALAVRAS CHAVES: Lúpus cutâneo; Fotoprotetor; Anticorpos Anti- SSA/Ro.

[114] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[115] Docentes do Curso de Farmácia da FAECE

INFLUÊNCIA DE USUÁRIOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE FITOTERÁPICOS SEM PRESCRIÇÃO.

Luciana dos Santos Silva[116]
Kelly Sivocy Sampaio Teixeira[117]

INTRODUÇÃO: Estima-se que 80% da população mundial utilizam fitoterápicos como a primeira automedicação antes de procurar orientação médica, pois a maior parte da população tem acesso às plantas destinadas a produção dos fitoterápicos. **OBJETIVO**: O presente estudo teve como objetivo conhecer, a influência dos fitoterápicos no Distrito de Palestina município de Novo Oriente – Ceará e o conhecimento que essa população tinha sobre ele**. METODOLOGIA**: Os dados foram coletados no mês de abril de 2014, onde foi realizada entrevista com aplicação de um questionário aos voluntários que procuraram os serviços no Posto de Saúde dessa região para atendimentos diversos, a entrevista foi realizada com 100 pessoas com idades de 18 e 100 anos onde não houve critério de exclusão. **RESULTADOS**: Observou-se que a maioria dos entrevistados era do sexo feminino 72% e 30% analfabetos. Dos entrevistados 97% com idades variadas disseram utilizar plantas medicinais para fins medicamentosos e 3% com idade entre 18 a 29 anos disseram que não fazem utilização de plantas medicinais. As plantas medicinais mais citadas foram: Camomila Erva cidreira, Capim-Santo, Erva doce. Quando perguntados se os fitoterápicos podem causar mal a saúde 87% de todos os entrevistados acreditam que plantas medicinais ou medicamentos feitos à base de plantas não causam nenhum mal à saúde. **CONCLUSÃO:** A partir destes resultados, verificamos que é importante a realização de campanhas para a conscientização da população.

PALAVRAS-CHAVE: Fitoterápicos. Plantas Medicinais. Uso racional. Reações adversas.

[116] Acadêmica do Curso de Farmácia da FAECE
[117] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

PERFIL DOS PACIENTES INFARTADOS COM DIABETES DESCONHECIDA

NÍVEA MARIA AS SILVA NUNES[118]
LANA KARINE VASCONCELOS BARROSO[119]

INTRODUÇÃO: Devido a uma série de fatores, como alimentação, vida sedentária e tabagismo, por exemplo, é cada vez mais comum as pessoas apresentarem algum problema de saúde crônica associado à comorbidades, como a relação entre o infarto agudo miocárdio e a diabetes, sendo necessário um acompanhamento desses pacientes, pois a diabetes, assim como o infarto, afeta uma grande parcela da população e pode trazer inúmeras complicações. **OBJETIVOS:** Este projeto tem o objetivo de avaliar o perfil dos pacientes infartados que desconhecem o diabetes. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, documental com abordagem quantitativa que será realizado no Hospital Terciário Da Rede Pública, Hospital de Messejana - Dr. Carlos Albert Studart Gomes no mês de agosto de 2015 a partir dos prontuários dos pacientes, após a devida aprovação do Comitê de Ética. **RESULTADOS:** Espera-se, com a realização desse estudo, traçar o perfil dos pacientes infartados e que são também diabéticos e, assim, propor estratégias para conscientizar a população sobre os cuidados necessários para sua saúde. **CONCLUSÃO:** Sabe-se que a diabetes, assim como o infarto agudo do miocárdio é um problema de saúde crônico que afeta cada vez mais um maior número de pessoas. Por isso, destaca-se a importância de conhecer a doença, assim como sua relação com a qualidade de vida do indivíduo, de forma a não afetar a saúde das pessoas. Tendo-se, dessa forma, subsídios para ações de promoção da saúde efetivas destinadas a esses grupos populacionais em questão.

PALAVRAS CHAVES: Infarto do Miocárdio Agudo; Diabetes. Assistência de Enfermagem; Cuidado.

[118] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[119] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

IMPACTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM TRABALHADORES HIPERTENSOS EM UMA INDÚSTRIA

Silvia Helena S. das Chagas[120]
Emerson Ramalho Ferreira[121]

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença de alta prevalência na população adulta, atingindo cerca de 30 milhões de brasileiros. Destes, cerca de 50% não sabem que são hipertensos por seguirem, por vezes, assintomáticos. **OBJETIVO:** Verificar o impacto de educação em saúde na adesão ao tratamento medicamentoso de trabalhadores hipertensos em uma indústria. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo com abordagem qualitativa. Será aplicado um instrumento de Consulta de Enfermagem e verificação de pressão arterial, em funcionários de uma indústria, onde será realizada uma entrevista para coletar dados sobre como será o tratamento medicamentoso do funcionário portador de hipertensão arterial sistêmica e seu conhecimento sobre a doença, seus riscos, e sintomas. **RESULTADOS ESPERADOS**: Melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, melhorar o desempenho na execução de suas atividades, aumento da produtividade e diminuição do absenteísmo, Melhor qualidade de vida, e diminuição de complicações mais graves. **CONCLUSÃO:** Este trabalho possibilitará uma melhor compreensão dos portadores da HAS quanto a sua adesão ao tratamento medicamentoso, e prevenindo as complicações, promovendo sua saúde e bem-estar, e proporcionando qualidade de vida, aos trabalhadores da indústria.

PALAVRAS-CHAVES: Hipertensão arterial, Saúde ocupacional, Adesão ao Tratamento.

[120] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[121] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

ANÁLISE DE QUALIDADE DE CÁPSULAS MANIPULADAS E INDUSTRIALIZADAS DE CEFALEXINA

Luana Nayara de Oliveira Benício[122]
Ticiana Praciano Pereira[123]

INTRODUÇÃO: A Cefalexina é um antibiótico do grupo das cefalosporinas de primeira geração utilizado em infecções do trato respiratório, pele, osso e geniturinário por germes suscetíveis. Toda farmácia de manipulação deve seguir rigorosamente as boas práticas de manipulação. **OBJETIVO**: O presente estudo objetivou analisar a qualidade de cápsulas de Cefalexina 500mg manipuladas em uma farmácia de Fortaleza comparada com o produto industrializado. **METODOLOGIA**: Foi realizado inicialmente a coleta de dados referentes às quantidades de fórmulas contendo antibióticos manipulados no período de janeiro a dezembro de 2014. Os dados foram obtidos a partir do programa fórmula certa. Na farmácia comercial a pesquisa foi feita através das receitas armazenadas no próprio estabelecimento. Em seguida, foram realizados ensaios físico-químicos preconizados pela farmacopeia brasileira e americana para cefalexina. **RESULTADOS**: As duas amostras foram aprovadas quanto ao peso médio e tempo de desintegração. Foi observado que no peso médio as cápsulas de cefalexina manipulada tiveram o desvio padrão menor 2,05%, comparado com a industrializada 3,01%. Na avaliação do tempo de desintegração as cápsulas manipuladas desintegraram por total em 4 minutos e 53 segundos, enquanto a industrializada em 15 minutos e 36 segundos. Para dar continuidade aos ensaios de qualidades será realizado ensaios de dissolução de ambas as amostras. **CONCLUSÃO**: De acordo com nossos resultados as amostras analisadas foram aprovadas de acordo com a farmacopeia brasileira e o medicamento manipulado mostrou possuir qualidade semelhantes ao industrializado.

Palavras-chave: Manipulação. Controle de qualidade. Farmácia Magistral.

[122] Acadêmica do Curso de Farmácia da FAECE
[123] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS : NECESSIDADES E BUSCA DE INFORMAÇÃO

Ingrid Martes Gomes da Silva[124]
Denise de Fátima Fernandes Cunha[125]

INTRODUÇÃO: A enfermagem baseada em evidências é processo humanizado que proporciona sempre o melhor cuidado e atenção visando à recuperação da saúde e o bem-estar do paciente. A implementação da assistência de enfermagem possibilitou uma atenção direcionada a um atendimento com qualidade e aperfeiçoamento, que fornece o melhor atendimento possível á maioria das pessoas, usando os recursos de modo eficaz. **OBJETIVO:** Conhecer as principais fontes de informações para tomada de decisão dos enfermeiros. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descrito, prospectivo com abordagem quantitativa, por meio de questionário coletando dados dos profissionais enfermeiros nas unidades básicas de saúde das Secretarias Executivas regionais de Fortaleza**. RESULTADOS ESPERADOS:** Obter uma análise das necessidades e busca de informação para decisões na qualidade da assistência prestada ao paciente. **CONCLUSÃO:** A enfermagem desenvolve seus conhecimentos, habilidades, análise dos dados de pacientes e promove intervenções de enfermagem. O resultado dessas intervenções ajuda na adequação da assistência prestada nos procedimentos e ajuda no aprendizado dos profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Práticas Baseadas Evidências. Assistência de enfermagem

[124] Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FAECE
[125] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

TERAPIA GÊNICA, RISCOS E BENEFÍCIOS

Aline Silva Lima; André Luis Fernandes de Souza; Antônio Mariano da Silva Neto; Cristiana de Vasconcelos Fontenele; Elayne Esteves da Silva; Francisco Ivanildo Bezerra de Oliveira; Nilton César Fernandes; Manoel Ângelo da Silva Neto; Paulo Roberto Alves da Silva; Valmireudo Alves de Aragão; Weberson de Menezes Lacerda[126]
Alba Fabíola Costa Torres[127]

INTRODUÇÃO: A terapia gênica consiste em inserir um gene sadio na célula do paciente fazendo com que a célula se reproduza com o gene alterado. **OBJETIVO:** O objetivo do presente estudo é apresentar os benefícios e riscos que a terapia gênica pode trazer, a partir da inserção de genes sadios com o uso de técnicas de recombinação genética. **METODOLOGIA:** Estudo realizado através de revisão bibliográfica, utilizando artigos publicados no período de 1997 a 2010, disponíveis na base de dados do Scielo, PubMed e revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento. **RESULTADOS:** Ainda há muito que se descobrir e entender da terapia gênica. Mesmo existindo sucessos pontuais indicando a viabilidade da incorporação da terapia gênica na prática médica. Contudo, embora seja possível tratar doenças que eram até então incuráveis, a terapia gênica apresenta também questões bioéticas, entre elas o fato de modificar definitivamente o patrimônio genético. **CONCLUSÃO:** A terapia gênica é sim promissora para a aplicação médica pois a possibilidade de curar doenças através da transferência de informação genética é real, embora existam ainda algumas incertezas quanto à relação risco- benefício.

PALAVRAS-CHAVE: Terapia gênica; Genoma humano; Isolamento de genes.

[126] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[127] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

SUMUÁRIO DE URINA: EXAME QUÍMICO DA URINA

Karine Stefany Medeiros; Larissa Rebeca Apolònio; Cícera Silmara Alves[128]
Mariana Dantas[129]

INTRODUÇÃO: O exame sumário de urina pode nos fornecer pistas importantes sobre doenças, principalmente sobre problemas nos rins e nas vias urinárias. A presença de sangue, piócitos (pus), proteínas, glicose e diversas outras substâncias na urina costuma ser importantes para diagnóstico de algumas doenças. Vários testes bioquímicos são realizados rápida e facilmente na urina usando métodos de fitas reagentes. Testes químicos realizados por fitas reagentes estão incluídos na urinálise de rotina, podem também ser solicitados como teste isolados. Algumas tiras reagentes podem testar até 10 substâncias. **OBJETIVO**: Conhecer os parâmetros químicos utilizados na análise de urina relacionando os resultados dos testes aos diagnósticos de determinadas doenças. **METODOLOGIA**: De acordo com pesquisas bibliográficas as tiras reagentes, tiras plásticas finas acopladas a almofadas de reagentes, são mergulhadas na urina e observa-se que os reagentes químicos presentes nas almofadas reagem rapidamente com as substâncias da urina formando alterações na coloração das almofadas. **RESULTADOS**: Observou-se que os resultados da análise química da urina fornecem informações sobre o metabolismo dos carboidratos, as funções do rim e fígado e o equilíbrio do pH. Em algumas situações os resultados dos testes químicos na urina são fundamentais para diagnósticos. **CONCLUSÃO**: Concluímos que o exame químico da urina é frequentemente executado e fornece informações importantes para o diagnostico e tratamento de determinadas doenças e condições. Concluímos também que os resultados de testes químicos anormais são, às vezes, a primeira indicação de um problema renal ou outras partes do corpo. Assim esses testes podem ajudar na confirmação de um diagnostico.

PALAVRAS CHAVES: sumário de urina, fitas reagentes e urinálise.

[128] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[129] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

PERFIL DO USO DE MEDICAMENTOS ANOREXÍGENOS POR ALUNOS DO CURSO DE FARMÁCIA EM UMA FACULDADE DE FORTALEZA-CE

Leinad Araújo Oliveira[130]
Mariana Brito Dantas[131]

INTRODUÇÃO: A obesidade é considerada um dos principais problemas de saúde pública que tem atingido tanto países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento. O seu tratamento consiste em mudanças de vida, relacionado aos hábitos alimentares e às atividades físicas, contanto, muitas pessoas recorrem aos agentes de emagrecimento como os anorexígenos em busca de opções mais fáceis para o controle de peso, não considerando os riscos dos efeitos adversos, tolerância e dependência. **OBJETIVO**: Avaliar o perfil do uso de medicamentos anorexígenos por alunos de uma faculdade em Fortaleza-Ce. **METODOLOGIA**: A pesquisa foi estruturada e desenvolvida seguindo uma abordagem transversal e de campo com amostra de 100 acadêmicos que responderam um questionário com de doze questões. **RESULTADOS**: Verificou-se que 19% dos estudantes usaram drogas antiobesidade, sendo que 73,68% foram anorexígenas e o maior consumo foi do medicamento sibutramina(57,89%).Constatou-se que 53,63% fizeram uso dos medicamentos para tratamento sem acompanhamento médico, 47% não passaram por avaliação nutricional para reduzir peso e 53% não fazem atividade física. Os efeitos secundários mais citados decorrentes dos anorexígenos foram boca seca e taquicardia. **CONCLUSÃO**: A reeducação alimentar e a prática regular de atividade física, como primeira escolha no tratamento da obesidade tem quer ser avaliado profundamente para chegar ao objetivo desejado. Melhorando critérios de monitoramento, orientações e programas educativos para todos sujeitos envolvidos no processo como os prescritores, responsáveis pela dispensação e os usuários, mediante que os anorexígenos possuem sistema de controle especial(RDC50/14).

PALAVRAS-CHAVES: Anorexígenos. Efeitos Colaterais. Obesidade.

[130]Acadêmica do curso de Farmácia FAECE
[131]Docente do curso de Farmácia FAECE

PERFIL DE VENDAS DOS MEDICAMENTOS USADOS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE EM UMA FARMÁCIA COMERCIAL EM CASCAVEL-CE

Maria Lucineide Chaves Silva[132]
Mariana Brito Dantas[133]

INTRODUÇÃO: A Osteoporose é uma doença multifatorial, caracterizada por perda de massa óssea, aparece lentamente, é assintomática e progressiva levando a maior predisposição à fraturas. Ambos os sexos são acometidos, porém é mais comum em mulheres na pós- menopausa em consequência da deficiência estrogênica. Para prevenir é necessário fazer um diagnóstico através de uma investigação minuciosa dos fatores de risco para osteoporose e fraturas. Das opções terapêuticas disponíveis, os bisfosfonatos constituem tratamento de escolha. **OBJETIVO:** Avaliar o perfil das vendas dos medicamentos utilizados para prevenção e tratamento da osteoporose: carbonato de cálcio associado à vitamina D, risedronato sódico e alendronato de sódio vendidos em uma farmácia comercial no município de Cascavel-Ce. **METODOLOGIA:** trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva, retrospectiva à partir do relatório de vendas no período de janeiro à dezembro de 2014, analisados e expostos em gráficos do Microsoft Excel 2010. **RESULTADOS:** Houve maior incidência nas vendas do carbonato de cálcio associado à vitamina D (74%), usados principalmente na prevenção da osteoporose. Os medicamentos risedronato e alendronato são vendidos em menor escala, 16% e 10% respectivamente devido o uso referir-se ao tratamento, diagnosticado e acompanhado pelo profissional médico. **CONCLUSÃO:**O carbonato de cálcio associado à vitamina D, apresentou maior relevância de vendas em relação aos bisfosfonatos por ser usado no tratamento preventivo. Os bisfosfonatos provocam efeitos colaterais indesejáveis culminando com o abandono do tratamento.

Palavras-chave: osteoporose, pós- menopausa, tratamento, bisfosfonatos.

[132] Acadêmica do Curso de Farmácia da FAECE
[133] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EMAGRECEDORAS EM UMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE FORTALEZA.

Rafaela Felix de Sousa[134]
Ticiana Praciano Pereira[135]

Introdução: O uso de fitoterápicos para o tratamento da obesidade e para a perda de peso, em geral tem crescido nos últimos anos. Apesar da maioria dessas substâncias não terem muitos estudos que comprovem sua eficácia e sua segurança, são bastante comercializadas. As substâncias selecionadas são as com maior prevalência de uso na farmácia de manipulação. São elas: Cassiolamina, Faseolamina e Glucomanan. **Objetivo:** Esse trabalho tem como objetivo avaliar o uso de substâncias emagrecedoras por pacientes cadastrados em uma farmácia de manipulação de Fortaleza. **Metodologia:** Com a utilização de um questionário será possível divulgar os resultados encontrados, entre eles, o papel do farmacêutico no auxílio a esse paciente. **Resultados:** A partir do presente estudo será possível observar a prevalência de utilização das substâncias naturais com ação de emagrecimento bem como identificar algumas características relacionadas aos usuários. **Conclusão:** Concluiremos nossa pesquisa com respostas sobre o a busca ou não de orientação de um farmacêutico para esse tratamento. Tentaremos identificar se esse paciente faz associação de tratamento não farmacológico, como dieta e exercício físico e se houve perda de peso satisfatória para o usuário das substâncias.

Palavras- chaves: fitoterápicos, obesidade, emagrecer.

[134] Acadêmica do Curso de Farmácia da FAECE
[135] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS EM RELAÇÃO AOS CUIDADOS PRESTADOS AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO.

Rosiane da Costa Gomes[136]
Bruna Michelle Belém Leite[137]

INTRODUÇÃO: O acidente vascular encefálico é caracterizado por um déficit neurológico focal súbito devido a uma lesão vascular. Diante desta patologia é fundamental a atuação do enfermeiro prestando os cuidados essenciais para recuperação e reabilitação das funções vitais e neurológicas deste paciente. **OBJETIVO:** Avaliar o conhecimento dos enfermeiros em relação aos cuidados prestados ao paciente com acidente vascular encefálico internado em uma unidade de cuidados intensivos. **METODOLOGIA:** Estudo do tipo transversal com enfoque quantitativo a ser realizado em uma Unidade de Cuidados Especiais de um hospital do Estado do Ceará de nível secundário no qual irá ser realizada a pesquisa após a aprovação do comitê de ética. Será aplicado um instrumento de pesquisa para avaliação do nível de conhecimento dos enfermeiros em relação aos cuidados prestados ao paciente com acidente vascular encefálico, os dados coletados serão organizados no software SPSS (*Software Package for Social Sciences*) versão 18.0. A seguir, serão construídos tabelas e gráficos que possibilitem a apresentação dos dados. Os mesmos serão analisados tendo como suporte teórico a literatura existente acerca da temática em estudo. **RESULTADOS ESPERADOS:** Após o término do estudo poderemos identificar o perfil dos enfermeiros que prestam cuidados ao paciente com acidente vascular encefálico na unidade de cuidados intensivos bem como suas dificuldades e nível de conhecimento dos cuidados prestados. **CONCLUSÃO**: Através desta pesquisa poderemos avaliar e descrever o nível de percepção e autonomia dos enfermeiros com relação aos cuidados prioritários ao paciente com acidente vascular encefálico evitando a piora do prognóstico em relação ao seu quadro clínico.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem, Enfermagem, Unidade de Terapia Intensiva.

[136] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[137] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA AO PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: ESTUDO DE CASO

Fernanda Evangelista, Marina Leite Diniz, Vanina Fortuna[138]
Bruna Michelle Belém Leite Brasil[139]

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível degenerativa que traz várias complicações para a saúde do portador, caracterizada pela elevação da glicose no sangue, mas, pode ser evitado e/ou controlado através de dieta e mudança no estilo de vida, incentivado pela equipe de enfermagem. **OBJETIVO**: Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem a um paciente com diabetes mellitus tipo 2. **METODOLOGIA**: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. A coleta dos dados foi realizada em um hospital municipal de Fortaleza no mês de março de 2015, através da consulta de enfermagem na qual foi realizada anamnese, exame físico e consulta ao prontuário. **RESULTADOS:** L..F.B.M., 61 anos, sexo masculino, advogado, divorciado, residente no município de Fortaleza, portador de Diabetes Mellitus tipo 2 há 10 anos, após realização de consulta de enfermagem e exame físico foi possível identificar os seguintes diagnósticos de enfermagem: **Déficit de conhecimento sobre a doença** caracterizado por não conhecimento da sua patologia relacionado a alimentação incorreta e picos de hiperglicemia, cujas intervenções foram: orientar quanto a origem da doença, riscos e tratamento; **Uso incorreto da medicação** caracterizada pelos picos hiperglicêmicos e síncopes relacionado a não adesão as orientações feitas pelo enfermagem, cujas intervenções realizadas foram: orientações corretas quanto ao uso da medicação e aos riscos da não utilização correta da medicação; **CONCLUSÃO:** Reconhece-se, portanto, a importância da enfermagem na assistência ao paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2, cujas intervenções devem estar centradas no tratamento, prevenção ,promoção e reabilitação.

PLAVRAS-CHAVES: Diabetes Mellitus, Assistência de Enfermagem, Enfermagem.

[138] Acadêmicas do Curso de Enfermagem da FAECE
[139] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS INTERCORRÊNCIAS COM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM REGIME HEMODIALITICO

Vera Lucia Almeida[140]
Emerson Ramalho Ferreira[141]

INTRODUÇAO: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma síndrome clínica originada pela perda progressiva e irreversível das funções renais. **OBJETIVO:** Identificar as principais intercorrências que acometem pacientes renais crônicos em regime hemodialítico. Sistematizar a assistência de enfermagem nas intercorrências durante HD e sugerir condutas nas intercorrências durante HD. **METODOLOGIA:** Pesquisa do tipo exploratória, descritiva e qualitativa com uma característica de 192 pacientes que realizam HD três vezes por semana. O estudo será aplicado durante o mês de maio a junho, será preenchido um levantamento das intercorrências nas folhas de registro das sessões de HD. **RESULTADOS ESPERADOS:** Descrever as intercorrências em HD e a conduta do enfermeiro para corrigi-las, exemplos: hipotensão, uso de substâncias que expandem volume com S.F à 0.9 % e solução de glicose hipertônica e cloreto de sódio concentrado à 20%. Hipertensão uso de anti-hipertensivo. **CONCLUSAO:** Espera-se que o profissional que assiste o paciente nas sessões de hemodiálise, deve estar apto à prontamente intervir e assim evitar outras potenciais complicações, tornando essas ações vitais para a garantia de um processo seguro e eficiente para o paciente.

Palavras chave: Insuficiência Renal Crônica, Cuidados, Enfermagem, Intercorrência

[140] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[141] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO: ESTUDO DE CASO

Kathyane Deti Saboia Feitosa, Rebeca Sousa da Silva[142]
Bruna Michelle Belém[143]

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral é uma condição clínica que pode causar distúrbios de função cerebral que podem durar mais de 24 horas e podem levar a morte. **OBJETIVO:** Implementar a assistência de enfermagem ao paciente com AVC hemorrágico. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. A coleta foi realizada no Hospital Batista Memorial na cidade de Fortaleza em março de 2015. A coleta se deu através de entrevista e exame físico. **RESULTADOS:** Paciente, FEC, 53 anos, diagnosticado com AVC hemorrágico. Após consulta de enfermagem identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem: **Risco de dor aguda** caracterizada por relato verbal de dor, relacionada a agentes lesivos, cujas intervenções foram: investigar com o paciente os fatores que aliviam/pioram a dor e investigar o uso atual de métodos farmacológicos de alívio da dor pelo paciente; **Mobilidade física prejudicada**, caracterizada pela amplitude limitada de movimento, relacionada a restrições prescritas de movimento, cujas intervenções foram: explicar as razões da exigência do repouso no leito e posicionar em alinhamento corporal correto; **Constipação,** caracterizada por incapacidade de eliminar as fezes e relacionada à atividade física insuficiente, cujas intervenções foram: encorajar o aumento da ingestão de líquidos e orientar paciente/família sobre dieta com elevado teor de fibras. **CONCLUSÃO:** O estudo demonstrou que as principais intervenções de enfermagem aplicadas tiveram enfoque educativo para o paciente e seus familiares. Proporcionando uma melhor qualidade de vida a este paciente e um prognóstico positivo no que diz respeito a sua condição.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem, Enfermagem e Prevenção.

[142] Acadêmicas do Curso de Enfermagem da FAECE
[143] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Marcielma de Souza Oliveira[144]
Bruna Michelle Belém Leite Brasil[145]

INTRODUÇÃO: O envelhecimento pode ser incluído como método natural do ser humano, de redução progressiva da restrição funcional dos indivíduos. Dentre as principais causas que levam a ampliação da população idosa a buscar uma Instituição de Longa Permanência para Idosos são: dificuldade familiares, problemas de saúde, restrições das atividades de vida diária, estado mental, ausência de suporte e violência doméstica. **OBJETIVO:** Avaliar o desempenho dos idosos institucionalizados ao realizarem as suas atividades básicas de vida diária. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo com abordagem quantitativa e delineamento transversal. A ser realizado em uma instituição de longa permanência localizada na cidade de Fortaleza, na qual irá ser realizada a pesquisa após a aprovação comitê de ética. Após a identificação da amostra do estudo será aplicado um instrumento para a identificação do perfil sociodemográfico dos idosos e a seguir a escala de Katz. Os dados coletados serão organizados no *Software Package for Social Sciences* versão 18.0. Os mesmos serão analisados tendo como suporte teórico a literatura existente acerca das temáticas em estudo. **RESULTADOS ESPERADOS:** O referido projeto almeja a obtenção de dados que permitam identificar o nível de dependência e independência dos idosos institucionalizados em relação às atividades básicas de vida diária. Frente a essa realidade, a enfermagem tem um papel fundamental, pois uma vez identificando os idosos que tem dependência é preciso traçar um plano de cuidado individualizado. **CONCLUSÃO**: Ao final deste projeto espera-se despertar um maior interesse dos enfermeiros para com o cuidado com idoso institucionalizado e que seja permitido pra que todos sejam avaliados nas atividades de vida diárias**.**

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Institucionalização, Atividades Básicas da Vida Diária.

[144] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[145] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

PRÁTICA DE ALEITAMENTO MATERNO VIVENCIADA POR MULHERES TRABALHADORAS: PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS

Lidia Almeida Damasceno[146]
Ma Juliana Vieira Figueiredo[147]

INTRODUÇÃO: Os múltiplos papeis exercidos por mulheres na sociedade atual produziram muitas dificuldades para conciliar maternidade, cuidados com o lar, vida amorosa e profissional. Diante desses fatores surgiu a necessidade da mulher adiar a maternidade. Mesmo com tantas transformações a mulher não se distanciou do sonho de ser mãe. Entretanto, devido à carga excessiva de trabalho assumida pela mulher mãe, a prática de aleitamento materno pode apresentar desafios para estas. **OBJETIVO:** Identificar a percepção de mulheres trabalhadoras acerca de sua vivencia de aleitamento materno. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que será desenvolvido em uma empresa privada no município de Cascavel-Ce, com mulheres funcionárias da referida empresa, maiores de 18 anos, que tenham vivenciado a experiência de aleitamento materno e trabalho nos últimos seis meses. Serão realizadas entrevistas por meio de roteiro semiestruturado, em local privativo da instituição. Os dados serão analisados pela técnica de análise temática de Bardin. Este estudo atenderá aos preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme resolução nº466/2012. **RESULTADOS ESPERADOS:** A partir da identificação da percepção de mulheres trabalhadoras acerca de sua vivência de aleitamento materno, será possível o planejamento e implementação de estratégias para manutenção e continuidade do aleitamento materno.

PALAVRAS CHAVES: Aleitamento, trabalho, mulher; enfermagem; sociedade.

[146] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[147] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE ABORTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Francisca Mariza Batista Maia, Maria Elizangela Pereira de Sousa, José Clodoaldo dos Santos Sousa, Lisianne Maria Santos Sousa, Denise Fernandes[148]
Juliana Figueiredo[149]

INTRODUÇÃO: O Aborto é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o concepto pesa menos de 500g. Pode ser espontâneo ou provocado, considerando precoce até a 12ª semana e tardio entre a 13ª e a 22ª semanas, envolvendo sensações de perda, culpa pela impossibilidade de levar a gestação a termo, além de trazer complicações para o sistema reprodutivo. São classificados em ameaças de abortamento, abortamento inevitável, abortamento completo, abortamento incompleto, abortamento infectado, abortamento habitual e abortamento retido. Os fatores de risco são mulheres com idade ≥ 35 anos, só que esse risco se eleva consideravelmente quando temos a mulher com idade ≥ 35 anos e o homem ≥ 40 anos. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na produção de uma peça anatômica sobre Aborto. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre Aborto. **RESULTADOS:** A peça anatômica confeccionada demonstrava um tipo de aborto classificado como ameaça de abortamento, demonstrando todo o surgimento dos sinais de hemorragia decorrente desse tipo de aborto. Foram construídas com folha de isopor e EVA, pintadas com tintas apropriadas. **CONCLUSÃO:** Através da utilização da peça anatômica tivemos o conhecimento de todo o processo que ocorre durante um período gestacional em que a mulher sofre ameaça de abortamento e desta forma podemos ter uma melhor compreensão, por parte da comunidade acadêmica, sobre o tema.

DESCRITORES EM SAÚDE: Anatomia, Aborto, gravidez.

[148] Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FAECE
[149] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

DEPRESSÃO E DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS: UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM

Francisco Narcisio Bernardo do Nascimento Silva[150]
Georgina de Alencar Portela [151]

INTRODUÇÃO: A terceira idade é aquele período em que cada pessoa vive o seu tempo, que pode apresentar variações de acordo com a cultura de cada uma, além de ser influenciada pela sociedade a qual está inserida. Diante dessa realidade, atualmente, em todo o mundo, a sociedade vem passando por um dos maiores problemas originados pelo crescimento demográfico e com isso as pessoas vêm se perguntando o que podem fazer para assegurar a qualidade de vida da população idosa já que a expectativa de vida vem aumentando. **OBJETIVOS:** Avaliar a percepção dos acadêmicos de enfermagem quanto à depressão e a qualidade de vida na atualidade. **METODOLOGIA:** Para alcançar o objetivo proposto para esse estudo, a metodologia da pesquisa fundamenta-se em um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa. A mesma será realizada no mês de agosto de 2015, sendo para isso selecionado aplicado um questionário junto aos acadêmicos de enfermagem do 7º e 8º semestre. O desenvolvimento da pesquisa acontecerá após aprovação pelo Comitê de Ética. **RESULTADOS:** Tendo em visto o conjunto de aspectos relacionados a essa temática, espera-se saber se os estudantes de enfermagem estão aptos a cuidar dessa população, de modo a sugerir melhorias nas atividades práticas e no cuidado à saúde. **CONCLUSÃO:** Percebe-se que devido a esse crescimento cada vez maior da população de idosos, já é possível perceber algumas ações no intuito de adiar um pouco mais os efeitos naturais do desenvolvimento da velhice do homem, principalmente em relação ao físico e psicológico. No entanto, o que se percebe é que a sociedade não está preparada para essa nova realidade.

PALAVRAS CHAVES: Depressão. Qualidade de Vida. Idoso.

[150] Acadêmico do Curso de Enfermagem da FAECE
[151] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

AVALIAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Polyana Luiza Ferreira Uchoa[152]
Bruna Michelle Belém Leite Brasil[153]

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural, dinâmico e comum a todos os seres vivos, que compromete progressivamente aspectos físicos e cognitivos com perda da capacidade homeostática e o declínio gradual das funções fisiológicas. Na velhice o declínio intelectual é considerado um processo normal do envelhecimento então ocorre uma dificuldade de avaliar corretamente esse comprometimento cognitivo e diferenciar se são características iniciais de determinadas patologias ou se faz parte do próprio processo de envelhecer. **OBJETIVO:** Avaliar cognição de idosos institucionalizados. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo com abordagem quantitativa e delineamento transversal a ser realizado em uma instituição de longa permanência localizada na cidade de Fortaleza, na qual irá ser realizada a pesquisa após a aprovação comitê de ética. Após a identificação da amostra do estudo será a identificado o perfil sociodemográfico dos idosos e a seguir aplicado o Mini Exame do Estado Mental. Os dados coletados serão organizados no *Software Package for Social Sciences* versão 18.0. Os mesmos serão analisados tendo como suporte teórico a literatura existente acerca das temáticas em estudo. **RESULTADOS ESPERADOS:** O referido projeto almeja a obtenção de dados que permitam identificar o nível de cognição dos idosos institucionalizados a partir da aplicação do Mini Exame do Estado Mental. Frente a essa realidade, a enfermagem tem um papel fundamental, pois uma vez identificando os idosos com déficit de cognição é preciso traçar um plano de cuidado individualizado. **CONCLUSÃO**: Ao final deste projeto espera-se despertar um maior interesse dos enfermeiros para a avaliação do nível de cognição de idosos institucionalizados com a finalidade de estimular a promoção e prevenção de um envelhecimento ativo.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Institucionalização, Cognição.

[152] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[153] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

AVALIAÇÃO DO PERFIL DAS MULHERES ACOMETIDAS DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

GERUZA ALCÂNTARA PINHO[154]
LANA KARINE VASCONCELOS BARROSO[155]

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos percebe-se um aumento considerável de pessoas com infarto agudo do miocárdio (IAM). De acordo com os estudos já realizados e com os dados do DataSUS, vem crescendo o número de infartos entre a população feminina de todo o país, embora no geral, o número de internações por IAM entre os homens ainda seja maior. **OBJETIVOS:** Avaliar o perfil das mulheres acometidas de infarto agudo do miocárdio com relação aos fatores de risco. **METODOLOGIA:** Para o desenvolvimento da pesquisa será realizado um estudo de descritivo, de caráter quanti-qualitativo. Este será realizado em um hospital de referência da cidade de Fortaleza no mês de agosto de 2015 a partir dos prontuários das pacientes que tiveram infarto. O desenvolvimento da pesquisa acontecerá após aprovação pelo Comitê de Ética. **RESULTADOS:** Espera-se, com o desenvolvimento desse estudo, descrever o perfil epidemiológico de mulheres infartadas de modo que essa pesquisa possa auxiliar na prática os enfermeiros sobre as principais implicações na prática do cuida em enfermagem a mulheres infartadas. **CONCLUSÃO:** O infarto agudo miocárdio vem afetando cada vez mais a população, sendo cada vez maior o número de mulheres acometidas com essa patologia, assim, exercendo grande impacto na saúde pública. Por isso, torna-se relevante conhecer o perfil epidemiológico de mulheres infartadas para que se possam implementar medidas preventivas eficazes.

PALAVRAS CHAVES: Infarto do Miocárdio Agudo. Mulheres. Fatores de risco.

[154] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[155] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ACOMPANHANTES EM RELAÇÃO À ÚLCERA POR PRESSÃO

Madna Avelino Silva[156]
Bruna Michelle Belém Leite Brasil[157]

INTRODUÇÃO: A úlcera por pressão é definida como uma lesão de pele resultante da diminuição da vascularização do tecido, que como consequência ocorre à formação de um tecido necrosado e este fato ocorre devido à compressão do tecido por uma proeminência óssea, fatores do meio externo e aos longos períodos de imobilização. A Enfermagem assume um papel de destaque, uma vez que na prática clínica é a ela delegada a aplicação da escala de Braden que avalia o risco do desenvolvimento de úlcera por pressão de o que é fundamental para a implementação da sistematização da assistência de enfermagem. **OBJETIVO:** Avaliar o conhecimento de acompanhantes em relação à úlcera por pressão. **METODOLOGIA:** Trata se de um estudo descritivo com abordagem quantitativo que será realizada em uma unidade hospitalar de cuidados especiais em uma instituição hospital pública do município de Fortaleza. Os dados coletados serão organizados no *Software Package for Social Sciences* versão 18.0. A seguir, serão construídos tabelas e gráficos que irão possibilitar a análise estatística, tanto descritiva quanto inferenciais. Os dados serão analisados tendo como suporte teórico a literatura existente acerca das temáticas em estudo. **RESULTADOS ESPERADOS:** O desenvolvimento dessa pesquisa irá destacar o conhecimento do cuidador em relação ao tratamento, medidas de prevenção e complicações apresentando a importância da enfermagem em capacitar o mesmo para o cuidado no hospital e no domicílio. **CONCLUSÕES:** Ao final deste projeto espera-se despertar um maior interesse da enfermagem na capacitação do cuidador em relação à prevenção da úlcera por pressão.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidador. Úlcera por Pressão. Assistência de Enfermagem

[156] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[157] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES HIPERTENSOS

NATÁLIA SOUSA ALENCAR[158]
LANA KARINE VASCONCELOS BARROSO[159]

INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio, de acordo com os estudos já realizados em todo o país, continua sendo uma das causas que mais tem levado os pacientes a óbito. Diversos fatores estão relacionados a esse problema, dentre eles a hipertensão arterial sistêmica. Destaca-se assim, a importância do paciente, bem como de seus familiares conhecerem os fatores de risco do infarto. **OBJETIVOS:** Este projeto tem o objetivo de avaliar a associação entre os fatores de risco do infarto agudo miocárdio em pacientes hipertensos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, documental com abordagem quantitativa. A mesma será realizada no Hospital Terciário da Rede Pública, Hospital de Messejana - Dr. Carlos Albert Studart Gomes no mês de agosto de 2015, tendo como material para coleta de dados os prontuários dos pacientes que acometidos de infarto e que sejam hipertensos. O desenvolvimento da pesquisa acontecerá após aprovação pelo Comitê de Ética. **RESULTADOS:** Espera-se traçar o perfil dos pacientes acometidos de infarto e sua associação com a hipertensão. Assim, sendo possível identificar os principais cuidados de enfermagem direcionados aos pacientes infartados e hipertensos. **CONCLUSÃO:** O infarto é um problema que vem aumentando os casos de óbito em todo o país. A pesquisa buscará evidenciar a importância desse profissional de enfermagem o qual deve estar preparado para adotar medidas e práticas relacionadas aos cuidados a esses pacientes, de forma a ser possível sugerir medidas educativas para que os pacientes possam conhecer os cuidados em busca de uma melhor a qualidade de vida.

PALAVRAS CHAVES: Infarto do Miocárdio Agudo. Hipertensão Arterial. Cuidados em Enfermagem.

[158] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[159] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

INDICADORES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES PÚBLICAS E PARTICULARES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Kathyane Deti Saboia Feitosa[160]
Carla Daniele Mota Rego Viana[161]

INTRODUÇÃO: A educação em saúde é um instrumento importante no processo de informação individual e coletiva de compromisso e direitos à saúde. Uma das estratégias para afirmar a institucionalização e sustentabilidade dos projetos e ações é estimular a promoção da saúde no projeto político pedagógico da escola. Os enfermeiros vêm conquistando espaços importantes em diversos cenários do cuidado, principalmente como educadores em saúde, onde desenvolvem ações educativas de prevenção à doença e proteção à saúde**.** O profissional de enfermagem deve participar constantemente desse processo de educação em saúde, pois atuam no enfrentamento dos determinantes de riscos e agravos, dessa forma, ampliam a possibilidade de uma vida saudável, com o intuito de evitar mortes prematuras e incapacidades. **OBJETIVO:** Avaliar quais as políticas de saúde implementadas no ambiente escolar, qual tipo de educação voltada para a saúde e quais os serviços de saúde existentes no ambiente escolar. **METODOLOGIA:** Trata-se te um estudo descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa. Será realizada a aplicação de um questionário em alunos do ensino fundamental entre o 6º e o 9º ano de duas escolas do município de Fortaleza. Uma da rede pública e uma da rede privada. Entre os meses de agosto e setembro de 2015. Os dados serão apresentados em tabelas e analisados de acordo com a literatura pertinente da área. **RESULTADOS ESPERADOS:** Analisar os indicadores de saúde na escola bem como as políticas de saúde no ambiente escolar, qual o tipo de educação em saúde implantada nas escolas e os serviços de saúde ofertados no ambiente escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde. Escola. Enfermagem.

[160] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[161] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

ESTILO DE VIDA DE PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO QUE RETORNAM PARA A EMERGÊNCIA

LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA [162]
LANA KARINE VASCONCELOS BARROSO[163]

INTRODUÇÃO: Os pacientes, de um modo geral, ao passarem por um problema grave de saúde, procuram mudar o estilo de vida, de moda a se prevenir de problemas futuros. No entanto, o que se percebe é que passado o susto, alguns vão voltando a vida anterior, esquecendo de praticar atividade física, voltando aos maus hábitos alimentares e acabam voltando para emergência e tal problema não é diferente naqueles que sofreram infarto. **OBJETIVOS:** Este projeto tem o objetivo de analisar a qualidade de vida dos infartados, identificando os motivos que o fizeram retornar para a emergência. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, documental e retrospectivo, com abordagem quantitativa, que será realizada no mês de agosto de 2015 em um Hospital Estadual de Fortaleza. As informações serão extraídas dos prontuários dos pacientes e serão analisadas, para melhor compreensão, estatisticamente. A pesquisa será efetivada após aprovação do Comitê de Ética, de acordo com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. **RESULTADOS:** Espera-se, ao final do estudo, identificar como é o estilo de vida dos pacientes após o infarto e o que o levou de volta à emergência, fornecendo subsídios para que os enfermeiros da atenção primária possam atuar de forma preventiva junto a esses pacientes para que estes não voltem a ter outros episódios de infarto agudo do miocárdio. **CONCLUSÃO:** Os enfermeiros têm um papel importante na vida dos pacientes, pois esses, na área de saúde, são os que estão mais próximos. Por isso, é importante conhecer as causas que levam o infartado a retornarem para a emergência.

PALAVRAS CHAVES: Estilo de Vida. Infarto do Miocárdio Agudo. Emergência.

[162] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[163] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

DIFICULDADES NA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: PERCEPÇÕES DE MULHERES

Rebeca Sousa da Silva[164]
Juliana Vieira Figueiredo[165]

INTRODUÇÃO: O planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família. O enfermeiro tem papel fundamental no planejamento familiar, pois através da consulta de enfermagem ele tem possibilidade de prestar uma assistência mais completa, com intuito de informar, aconselhar a respeito do uso de métodos anticoncepcionais que mais se adaptam as condições da mulher. **OBJETIVOS:** Compreender a percepção de mulheres acerca das dificuldades vivenciadas para utilização de métodos contraceptivos. **METODOLOGIA:** Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, que será realizada em Unidade Básica de Saúde do município de Fortaleza. Participarão mulheres maiores de 18 anos de idade, que realizem acompanhamento na referida unidade de saúde. Serão realizadas entrevistas em local privativo da unidade, mediante consentimento prévio das participantes, quando estas comparecerem para consulta de prevenção do câncer de colo uterino ou planejamento familiar. Será utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados serão analisados pela técnica de análise temática de Bardin. Esta pesquisa respeitará os preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme resolução 466 de 2012. **RESULTADOS ESPERADOS:** Com a pesquisa pretende-se compreender a percepção de mulheres acerca das dificuldades vivenciadas para utilização de métodos contraceptivos. Assim, possibilitará a equipe de enfermagem a melhoria da qualidade da assistência prestada à mulher em período reprodutivo.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Familiar. Enfermagem. Conhecimento.

[164] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[165] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Elizângela Lopes de Sousa, Francisco de Assis Ferreira da Silva Filho, Francisco Silvanei dos Santos Gonçalves, Jackson Rodrigues Damasceno, Joelson Angelo Victor[166]
Denise de Fátima Fernandes Cunha, Juliana Vieira Figueiredo[167]

INTRODUÇÃO: Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é o termo utilizado para determinar uma série de tumores malignos e benignos originados do trofoblasto viloso placentário. Ela pode ser classificada em mola Hidatiforme, corioadenoma destruens, Coriocarcinoma, Tumor Trofoblástico de Sítio Placentário e Tumor Trofoblástico Epitelioide. Os fatores de risco são mulheres grávidas abaixo dos 20 e maiores de 35 anos de idade, antecedentes de gestação molar e abortamento. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na produção de uma peça anatômica sobre DTG. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre Doença Trofoblástica Gestacional. **RESULTADOS:** A peça anatômica é composta por cinco estruturas separadas, representando o sistema reprodutor feminino. Foram construídas em material plástico incolor, tingidas por tinta apropriada. As estruturas confeccionadas foram: corioadenoma destruens, coriocarcinoma, mola hidatiforme, prenhez normal, gravidez ectópica e abortamento. **CONCLUSÃO:** A utilização de peças anatômicas possibilita uma visualização das alterações que ocorrem no organismo materno decorrentes da DTG possibilitando uma melhor compreensão, por parte da comunidade acadêmica, sobre o tema.

DESCRITORES EM SAÚDE: Doença Trofoblástica Gestacional, Enfermagem, gravidez.

[166] Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FAECE
[167] Docentes do Curso de Enfermagem da FAECE

CARACTERIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SAMU CE

ILANA LARA MARQUES FERREIRA[168]
Yandara Alice Ximenes Bueno Carvalho[169]

INTRODUÇÃO: Historicamente, existem evidências de que a rapidez no atendimento nas emergências e urgências têm uma importância expressiva na sobrevida daqueles que se encontram com agravos na saúde por causas externas ou clínicas. Tendo como intuito minimizar os índices de mortalidade por causas externas, foi implantado pelo Ministério da Saúde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Atualmente, os números de acidentes são cada vez maiores e muitos deles envolvem adolescentes, seja por causas traumáticas, provocadas principalmente por imprudência no trânsito, ou por causas clínicas. De modo geral as causas externas apresentam um alto índice de mortalidade e o SAMU tem como principal propósito atuar o mais rápido para reduzir esses números. **OBJETIVOS:** Avaliar as características das ocorrências envolvendo adolescentes atendidos pelo SAMU-CE. **METODOLOGIA:** Para alcançar o objetivo proposto, a metodologia da pesquisa fundamenta-se em um estudo documental do sistema de informação do SAMU do Ceará com abordagem quantitativa. A mesma será realizada no mês de agosto de 2015, sendo para isso selecionado somente as ocorrências entre adolescentes. O desenvolvimento da pesquisa acontecerá após aprovação pelo Comitê de Ética. **RESULTADOS:** Tendo em visto o conjunto de aspectos relacionados a essa temática, espera-se listar as evidências a cerca desse problema, e assim poder ajudar aos profissionais de saúde no tipo de assistência prestada. **CONCLUSÃO:** O SAMU, no contexto do SUS tem contribuído para salvar vidas, sendo necessário contar com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar que tenham uma capacitação periodicamente, permitindo qualificar os tipos de ocorrência de modo a implementar as melhores medidas na prevenção dos agravos.

PALAVRAS CHAVES: Adolescentes. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Cuidados enfermagem.

[168] Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
[169] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO EM ACADÊMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FAECE

Vanina Paula da Silveira Fortuna[170]
Lana Karine Vasconcelos Barroso[171]

INTRODUÇÃO: O medicamento, como uma das formas para o tratamento de doenças ou para o alívio de sintomas, faz parte do autocuidado comum aos pacientes. Com ênfase na saúde é que esse tipo de autocuidado pode ser analisado pela enfermagem, através de momentos de educação em saúde, por exemplo, com a finalidade de evitar o uso indiscriminado de medicamentos sem prescrição médica. **OBJETIVO**: Este projeto tem o objetivo de avaliar a prática da automedicação entre graduandos do curso de Enfermagem de uma faculdade do município de Fortaleza. **METODOLOGIA**: Trata-se de um estudo de descritivo, de caráter quanti-qualitativo. A coleta de dados será realizada na Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará, situada no município de Fortaleza, nos meses de setembro a novembro de 2015, através da aplicação de um questionário semi-estruturado, abordando variáveis sociodemográficas, bem como de práticas e conhecimento sobre a automedicação pelos estudantes entrevistados. **RESULTADOS:** Espera-se, ao final da pesquisa, traçar o perfil de automedicação entre os estudantes de enfermagem, relacionando com variáveis como sexo, idade, semestre em curso e formas de indicação de uso dos medicamentos. **CONCLUSÃO:** O uso responsável dos medicamentos que não possuem prescrição médica aparece como uma das possíveis intervenções de enfermagem a partir da Sistematização da Assistência de Enfermagem, que incluem trabalhar o cuidado do estado físico e emocional e o apoio social e profissional. Reconhece-se, portanto, a importância da enfermagem na assistência aos pacientes, cujas intervenções necessitam de práticas de educação continuada, prevenção e identificação dos eventos adversos vindos da prática da automedicação.

PLAVRAS-CHAVES: Automedicação, Estudantes, Educação superior.

[170] Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FAECE
[171] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO TRABALHO DE PARTO E PARTO

Anna Caroline da Costa Xavier, Jéssica Regina da Cruz Macêdo, Luiz Fernando de Almeida, Kellyshandra de Lima Bezerra de Almeida, Regivânia Sousa Lima[172]
Monique Lima, Rosilane G. dos Santos Paixão[173]

INTRODUÇÃO: A atuação do fisioterapeuta na saúde da mulher cada vez mais ganha espaço. Muitas intervenções são utilizadas e é crescente o número de estudos para comprovar e comparar estas condutas. O nascimento é vivenciado por etapas divididas entre pré-parto, parto e puerpério, cada um necessita de um olha diferenciado do fisioterapeuta e suas técnicas devem ser condizentes com este momento. **OBJETIVO**: Pretende-se com o estudo identificar alternativas para que as mulheres tenham experiências satisfatórias na perspectiva do parto humanizado, destacando o aspecto físico e mental. **METODOLOGIA**: Esta pesquisa trata-se de uma revisão de literatura. Foram realizadas pesquisas nas bases eletrônicas de dados, PubMed, SciELO e LILACS. Tendo como seus descritores: Puérpera, fisioterapeuta no trabalho de parto, saúde da mulher. **RESULTADO**: O papel do fisioterapeuta durante o parto vai além das orientações oferecidas no pré-natal. O acompanhamento da parturiente deve ser feito na tentativa de corrigir posturas álgicas, aliviar tensões, direcionar o posicionamento durante o parto e utilizar técnicas não farmacológicas para alívio da dor como tens, massagens, exercícios respiratórios, deambulação, termoterapia, oferecendo maior conforto à mulher. **CONCLUSÃO**: O suporte físico e emocional promovido pelo fisioterapeuta durante o trabalho de parto e o parto de baixo risco parece contribuir para sua humanização e a do nascimento ao proporcionar à parturiente, bem-estar físico, redução das percepções dolorosas, aumento da confiança, redução do medo e da ansiedade, e maior consciência do processo.

PALAVRAS CHAVE: Puérpera, fisioterapeuta no trabalho de parto, saúde da mulher.

[172] Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da FAECE
[173] Docentes do Curso de Fisioterapia da FAECE

CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE UMA DAS COMPLICACÕES DA GRAVIDEZ: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Dayane Alcântara da Silva Alves, Francisco Josiel de Sousa, Jose Antônio de Oliveira, Nívia Maria de Araújo da Silva[174]
Denise Fernandes, Juliana Figueiredo[175]

INTRODUÇÃO: é uma gestação que se desenvolve fora do útero. Na maioria dos casos de gravidez ectópica (95 por cento), a implantação acontece em uma das tubas uterinas (ou trompas de Falópio), ela também é conhecida como gravidez tubária. Conforme a gravidez se desenvolve, surgem dores e sangramento, e, se a situação não for identificada, a trompa pode se romper, provocando hemorragia interna. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na produção de uma peça anatômica sobre uma das complicações da gravidez. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre uma gravidez ectópica. **RESULTADOS:** A peça anatômica é composta por uma estrutura, representando o sistema reprodutor feminino. Foi construída com ingrediente de origem minera extraído do solo argila, arame, tingidas por tinta de tingir tecido. A estrutura confeccionada foi: as tubas uterinas, onde ocorre gravidez ectópica. **CONCLUSÃO:** A utilização de peças anatômicas possibilita uma visualização das alterações que ocorrem no organismo materno decorrentes da gravidez ectópica possibilitando uma melhor compreensão, por parte da comunidade acadêmica, sobre o tema.

DESCRITORES EM SAÚDE: complicações da gravidez, Anatomia , Ensino.

[174] Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FAECE
[175] Docentes do Curso de Enfermagem da FAECE

ANABOLIZANTES - BENEFÍCIOS OU MALEFÍCIOS?

Elisabeth Barbosa Guimarães, Ana Cláudia Santos, Maria Hellen Matias Vitor, Carlos Gleison Lima dos Santos, Kildery Moura, Cinthya Cavalcante, Lanna Ferreira, Ernesto Cunha,Francisco Welton Lopes. Jayane Mara[176]
Profa. Dra. Alba Fabíola C. Torres[177]

INTRODUÇÃO: Os esteróides androgênicos anabólicos, conhecidos também como anabolizantes são uma classe de hormônios esteróides naturais e sintéticos, que promovem o crescimento celular e a sua divisão resultando no desenvolvimento de diversos tipos de tecidos, principalmente o muscular e ósseo. Os anabolizantes são drogas sintéticas laboratoriais derivadas do hormônio Testosterona, na qual foram desenvolvidos para o uso em tratamento de diversas doenças que afetam grande parte da população. **OBJETIVO**: O objetivo do trabalho foi conhecer os principais motivos do uso devido e indevido dos anabolizantes, expondo os benefícios e os malefícios do uso desses esteróides. Além dos principais malefícios causados e os benefícios no tratamento de diversas patologias, os anabolizantes são usados em diversos tratamentos terapêuticos, obtendo grande sucesso na cura de doenças, porém essas substâncias também geram muitos malefícios a saúde da população, pois o seu uso sem finalidade terapêutica, tem gerado doenças graves como problemas cardiovasculares e tumores diversos. **METODOLOGIA**: O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e sítios científicos, como SCIELO. Foi utilizado também recursos audiovisuais nos sites especializados em saúde, para facilitar o entendimento do assunto. **RESULTADOS**: O uso terapêutico dos anabolizantes tem apresentado eficácia em diversos tratamentos de doenças como: hipogonadismo, osteoporose, sarcopenia e até câncer de mama. Foi consultado também que essas substâncias podem apresentar comportamentos indesejáveis. Foram associados efeitos adversos no fígado, sistema cardiovascular, aparelho reprodutor e no estado psicológico em estudos terapêuticos. **CONCLUSÃO**: Portanto conclui-se que, devido os efeitos adversos serem vários, bastante arriscado, podendo assim ocasionar outros problemas mais graves, porém é impossível negar seu benefício.

PALAVRAS CHAVES: ANABOLIZANTES, TESTOSTERONA, ANABÓLICO

[176] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[177] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

SINDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA – SARA

Polyana Uchoa, Rosiane Gomes, Claudia Maria, Auricelio Sousa, Geisiane Maia, Luciano Oliveira[178]
Rosilaine G. Santos Paixão[179]

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Angústia Respiratória (SARA) tem como expressão clínica, alterações da permeabilidade da membrana alvéolo capilar, com extravasamento de plasma para o interior dos alvéolos resultando com isto, no desenvolvimento de edema pulmonar. Essa síndrome se caracteriza por uma hipoxemia refratária mesmo a altas frações inspiradas de oxigênio (FiO2. **OBJETIVO:** analisar a produção técnico-científica sobre o cuidado de enfermagem ao portador da SARA. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa exploratória, retrospectiva, do tipo revisão bibliográfica desenvolvida mediante a utilização de base nos acervos disponíveis em bibliotecas, livros, artigos científicos (scielo, bvs, medline). **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Não é uma doença específica, mas sim a agressão da barreira alvéolo-capilar por fatores etiológicos com características inflamatórias, que podem ser de origem pulmonar ou extrapulmonar. As causas diretas lesam o pulmão a partir do epitélio alveolar. Dentre elas podemos encontrar pneumonia, aspiração de conteúdo gástrico, contusão pulmonar, embolia pulmonar, inalação de gases tóxicos. **CONCLUSÃO**: A enfermagem na abordagem terapêutica da SARA é de fundamental relevância no processo do tratamento desse paciente. É válido ressaltar que a ausência prolongada de oxigênio pode causar complicações graves como, por exemplo, a insuficiência renal. Sem um tratamento imediato, a privação grave de oxigênio provocada pela síndrome causa a morte em 90% dos pacientes.

DESCRITORES: SARA, enfermagem, pulmonar.

[178] Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FAECE
[179] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

COMO CONVIVER COM A ANEMIA FALCIFORME

Aline S. Lima; Ana Claudia S. Pereira; Cristiana de V. Fontenele; Elayne E. da Silva; Ernesto C. B. Júnior; Francisco Ivanildo B. de Oliveira; José Wiler M. da Silva; Mirtes Elaine de S. Santos; Weberson de M. Lacerda[180]
Rosilaine G. dos Santos Paixão; Carlos Andrá Moura Arruda[181]

INTRODUÇÃO: A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil. **OBJETIVO:** Caracterizar o que é a doença falciforme, as formas de diagnóstico, opções de tratamento e medidas preventivas para amenizar os sintomas. **METODOLOGIA:** Trabalho realizado através de revisão bibliográfica, utilizando artigos e livros que foram publicados em período de 2006 a 2013, disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde e do SCIELO, a partir dos descritores: Anemia falciforme; Doença hereditária; Autocuidado na anemia falciforme. **RESULTADOS:** A anemia falciforme é uma doença hereditária que causa uma mutação na hemoglobina S provocando a distorção das hemácias, conferindo-lhes a forma de foice, ocasionando o encurtamento da vida média dos glóbulos vermelhos, obstruindo os vasos sanguíneos, causando dor e lesão de órgãos. A anemia falciforme pode ser diagnosticada na criança quando é realizado o teste do pezinho ou através da eletroforese de hemoglobina. Apesar de a doença não ter cura, o paciente pode prevenir as crises dolorosas adotando medidas simples como: manter-se hidratado, utilizar roupas confortáveis e não praticar atividades físicas e laborais que causem exaustão. Estes cuidados evitam as crises e em caso de dor o paciente pode ser submetido à escala analógica da dor para ser iniciada a administração correta de analgésicos e antiinflamatórios. A educação da família e do paciente sobre a doença é fundamental para garantir o bem estar social e mental dos mesmos. **CONCLUSÃO:** É imprescindível que o diagnóstico seja precoce para assegurar uma melhor qualidade de vida, já que o paciente será aconselhado a fim de otimizar o tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: Anemia falciforme; Doença hereditária; Autocuidado na anemia falciforme.

[180] Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FAECE
[181] Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

DOR CRÔNICA: SINTOMA QUE PASSOU A SER CONSIDERADA DOENÇA.

Elisabeth Barbosa Guimarães, Gracielly Fonseca de Britto, Renatho de Sousa da Silva, Maria de Fátima Maciel Oliveira, Carlos Gleison Lima dos Santos, João Paulo de Abreu, Francisco Josimar Santiago da Silva[182]
Profa. Rosi Paixão[183]

INTRODUÇÃO: A dor se manifesta como mal estar no corpo, e tende a ser encaminhada para tratamento médico. Quando se fala em dor, a tendência é associá-la a um fenômeno neurofisiológico. **OBJETIVO**: Mostrar que com o avanço da medicina podemos hoje dizer que, dor crônica é uma doença, que deve ser tratada logo no início dos primeiros sintomas para que uma dor aguda não passe a ser uma dor crônica. Com base que a dor é o quinto sinal vital, procurar descobrir além de medicamentos, outros meios que possam auxiliar no tratamento da dor crônica. **METODOLOGIA**: O presente trabalho foi realizado com base em recursos audiovisuais disponíveis na internet, pesquisas e reportagens em formatos de vídeos, que abordaram essa temática da dor crônica nos últimos anos, por meio de reportagens ou entrevistas e discursos de médicos que estudam o presente tema, também utilizamos arquivos recentes publicados no SCIELO como base para pesquisa. **RESULTADOS:** Os resultados obtidos relatam que o caminho para o tratamento é a correta mensuração da dor, no ambiente clínico hospitalar, que com o avanço da medicina moderna vem sendo cada vez mais abordado por diversos profissionais da área da saúde. **CONCLUSÃO**: A dor é mais que uma resposta resultante da integração central de impulsos dos nervos periféricos, ativados por estímulos locais. De fato a é dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial dos tecidos, distingue basicamente duas categorias: a dor nociceptiva e a dor neuropática, e até hoje não foi descoberta a cura para a dor crônica. Existe apenas o controle.

PALAVRAS CHAVES: DOR, CRÔNICA, NOCICEPTIVA, NEUROPÁTICA.

[182] Acadêmicos do Curso de Farmácia da FAECE
[183] Docente do Curso de Farmácia da FAECE

COMO CONVIVER COM A ANEMIA FALCIFORME

Aline S. Lima; Ana Claudia S. Pereira; Cristiana de V. Fontenele; Elayne E. da Silva; Ernesto C. B. Júnior; Francisco Ivanildo B. de Oliveira ; José Wiler M. da Silva; Mirtes Elaine de S. Santos; Weberson de M. Lacerda[184]
Rosilaine G. dos Santos Paixão; Carlos André Moura Arruda[185]

INTRODUÇÃO: A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil. OBJETIVO: Caracterizar o que é a doença falciforme, as formas de diagnóstico, opções de tratamento e medidas preventivas para amenizar os sintomas. METODOLOGIA: Trabalho realizado através de revisão bibliográfica, utilizando artigos e livros que foram publicados em período de 2006 a 2013, disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde e do SCIELO, a partir dos descritores: Anemia falciforme; Doença hereditária; Autocuidado na anemia falciforme. RESULTADOS: A anemia falciforme é uma doença hereditária que causa uma mutação na hemoglobina S provocando a distorção das hemácias, conferindo-lhes a forma de foice, ocasionando o encurtamento da vida média dos glóbulos vermelhos, obstruindo os vasos sanguíneos, causando dor e lesão de órgãos. A anemia falciforme pode ser diagnosticada na criança quando é realizado o teste do pezinho ou através da eletroforese de hemoglobina. Apesar de a doença não ter cura, o paciente pode prevenir as crises dolorosas adotando medidas simples como: manter-se hidratado, utilizar roupas confortáveis e não praticar atividades físicas e laborais que causem exaustão. Estes cuidados evitam as crises e em caso de dor o paciente pode ser submetido a escala analógica da dor para ser iniciada a administração correta de analgésicos e antiinflamatórios. A educação da família e do paciente sobre a doença é fundamental para garantir o bem estar social e mental dos mesmos.CONCLUSÃO: É imprescindível que o diagnóstico seja precoce para assegurar uma melhor qualidade de vida, já que o paciente será aconselhado a fim de otimizar o tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: Anemia falciforme; Doença hereditária; Autocuidado na anemia falciforme.

[184] Acadêmicos do curso de Farmácia da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE (Fortaleza/CE)
[185] Orientadores docentes do curso de Farmácia da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará-FAECE (Fortaleza/CE)

IMUNOENSAIOS IMPORTANTES PARA O DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS

Carlos Edgar da Silva; Cristiana de V. Fontenele; Elayne E. da Silva; Francisco Ivanildo B. de Oliveira ;Paulo Roberto Alves da Silva; Weberson de M. Lacerda[186]
Mariana Brito Dantas[187]

INTRODUÇÃO: O Imunoensaio detecta e quantifica antígenos e anticorpos, ou outras substâncias que desempenhem o papel de antígeno no ensaio. OBJETIVO: caracterizar os tipos de imunoensaios utilizados para realizar a detecção da sífilis, a identificação do teste de triagem e/ou confirmatório para Sífilis, como identificar as fases da doença. METODOLOGIA: Trabalho realizado através de revisão bibliográfica, utilizando artigos e livros, disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde e do SCIELO. RESULTADOS: A sífilis é uma infecção causada pelo Treponema pallidum, tem um espectro de manifestações clínicas que muda durante o curso da doença. Classicamente, a doença é caracterizada por uma lesão primária, uma erupção secundária, seguido por um período de latência e lesões tardias. Por muitos anos, a abordagem diagnóstica para sífilis tem sido baseada nos testes de imunoensaio, como: triagem por um teste não treponêmico semi quantitativo VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) ou RPR (Rapid Plasma Reagin), utilizando como antígeno a cardiolipina que normalmente ocorre no soro em níveis baixos e apresenta-se elevado na sífilis. O VDRL é uma reação de floculação, apresentando alta sensibilidade e baixa especificidade e na sequência a confirmação com achados clínicos com um teste treponêmico TPPA (Treponema pallidum particle agglutination assay) ou FTA Abs (fluorescent treponemal antibody-absorbed), são testes de imunofluorescência que apresentam especificidade entre 96% e 99%. Esta estratégia ainda está em uso na grande maioria dos laboratórios em todo o mundo recomendada pelo CDC. CONCLUSÃO: É imprescindível à adequação dos imunoensaios para realização dos testes treponêmicos e não treponêmicos assegurando a qualidade dos resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Imunoensaios; Sífilis; Identificação das fases da doença.

[186] Acadêmicos do curso de Farmácia da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará- FAECE (Fortaleza/CE).
[187] Orientadora docente do curso de Farmácia da Faculdade de Ensino de Cultura do Ceará – FAECE (Fortaleza/CE)

TERAPIA GÊNICA, RISCOS E BENEFÍCIOS

Aline Silva Lima; André Luis Fernandes de Souza; Antônio Mariano da Silva Neto; Cristiana de Vasconcelos Fontenele ; Elayne Esteves da Silva; Francisco Ivanildo Bezerra de Oliveira; Nilton César Fernandes; Manoel Ângelo da Silva Neto; Paulo Roberto Alves da Silva; Valmireudo Alves de Aragão; Weberson de Menezes Lacerda[188]

Alba Fabíola Costa Torres[189]

INTRODUÇÃO: A terapia gênica consiste em inserir um gene sadio na célula do paciente fazendo com que a célula se reproduza com o gene alterado. OBJETIVO: O objetivo do presente estudo é apresentar os benefícios e riscos que a terapia gênica pode trazer, a partir da inserção de genes sadios com o uso de técnicas de recombinação genética. METODOLOGIA: Estudo realizado através de revisão bibliográfica, utilizando artigos publicados no período de 1997 a 2010, disponíveis na base de dados do Scielo, PubMed e revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento. RESULTADOS: Ainda há muito que se descobrir e entender da terapia gênica. Mesmo existindo sucessos pontuais indicando a viabilidade da incorporação da terapia gênica na prática médica. Contudo, embora seja possível tratar doenças que eram até então incuráveis, a terapia gênica apresenta também questões bioéticas, entre elas o fato de modificar definitivamente o patrimônio genético. CONCLUSÃO: A terapia gênica é sim promissora para a aplicação médica pois a possibilidade de curar doenças através da transferência de informação genética é real embora existam ainda algumas incertezas quanto a relação risco benefício.

PALAVRAS-CHAVE: Terapia gênica; Genoma humano; Isolamento de genes.

[188] Acadêmicos do curso de Farmácia da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará –FAECE (Fortaleza/CE)

[189] Orientadora docente do curso de Farmácia da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará –FAECE (Fortaleza/CE)

ORIENTAÇÕES AOS AUTORES

POLÍTICA EDITORIAL

A Revista *FAECE Saúde* é um periódico semestral eletrônico, aberto à colaboração de docentes e discentes.

A Revista promove a publicação de resenhas de livros e procura debater temas de interesse geral através de entrevistas e/ou relatos de experiências. Publica também resumos de teses de doutorado e dissertações de mestrado, valorizando e estimulando a participação de autores pertencentes a duas ou mais instituições, aceitando, ainda, artigos em língua estrangeira. Nesse sentido, está aberta a colaborações, reservando-se o direito de publicar ou não os textos enviados espontaneamente à redação. Todos os artigos são submetidos à avaliação de dois pareceristas.

Será veículo da divulgação dos trabalhos dos Encontros de Iniciação Científica da área da Saúde.

A Revista FAECE *Saúde* está inserida no âmbito do termo de cooperação acadêmica aberta a intercambiar trabalho de outras instituições de ensino superior no âmbito da Saúde.

NORMAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO

As publicações serão editadas seguindo as normas oficiais da ABNT sendo submetidas previamente ao Conselho Editorial, para aprovação.

ARTIGOS CIENTÍFICOS

Deverão ser formatados, preferencialmente, com as - seguintes partes;

- Título
- Resumo
- Introdução
- Tópicos teóricos para embasar o trabalho (numerar os tópicos)
- Conclusão
- Referências Bibliográficas

RESENHAS

As resenhas devem ser originais, preferencialmente incluindo quadros, tabelas, gráficos, ilustrações, notas e referências. Estas devem apresentar, de modo sucinto, a obra, destacando as principais contribuições do autor, e/ou problematizando as elaborações ali expostas.

As resenhas devem ser enviadas em português, contendo título e subtítulo da obra, nome do autor, local de publicação, editora e ano de publicação, bem como uma breve informação sobre o resenhador (a titulação e a vinculação institucional).

RESUMOS EXPANDIDOS DE TESES, DISSERTAÇÕES E RELATÓRIOS DE PESQUISAS ACADÊMICAS

Os resumos expandidos deverão contendo o nome do texto, do autor e do professor orientador, com sua respectiva filiação institucional.

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

Os relatos de experiências têm como objetivo socializar pesquisas, estudos e atividades de natureza formativa, desenvolvidas ou em desenvolvimento em instituições acadêmicas, sindicais ou outras organizações sociais.

ENTREVISTAS

A Revista poderá publicar entrevistas realizadas com pesquisadores e militantes no âmbito das temáticas da Revista. Na primeira página da entrevista, deve constar o título da mesma, seguido de uma breve apresentação do entrevistado e do entrevistador.

PROCESSO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS/CONTATOS

Poderão ser submetidos trabalhos para publicação via e-mail: faece.edu@gmail.com, com o assunto "Artigo para publicação".

Os textos serão submetidos à avaliação de dois pareceristas, membros do Conselho Editorial.

O Conselho Editorial informará aos autores sobre a aceitação ou não de seus trabalhos, indicando, quando for o caso, possíveis alterações de natureza técnica nos textos submetidos à publicação.

TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS AUTORAIS

As publicações devem ser encaminhadas com as autorizações escritas e assinadas de transferência de direitos a Revista.